

较靠近；腹部背板被短卧毛。足黑色，腿节末端、胫节基部和端部棕黄色；足毛大部分黑色，较短，前、中腿节前侧具淡色长毛。翅稍带灰色。腋瓣淡黄色，缘缨白色。平衡棒棕黄色。

雌性 背板具 2 对不明显的灰色粉被纵条。腹部第 5 背板亦具灰斑。

共检查 28 号标本：

东北(1940.VI.13-28, 3 个；吉林高岭子, 1940)、江苏(1919.III.29-IV.5, 2 个, 1920.IV.9, 13 个, 1925.III.29, 2 个, 1932.III.31, 3 个, 1933.IV.11, 4 个)、云南(中甸, 1 个)。

分布 东北(吉林)、江苏、浙江、云南；欧洲。

51. 鼻颜蚜蝇属 *Rhingia* Scopoli, 1763

Rhingia Scopoli, 1763: 358. Type species: *Conops rostrata* Linnaeus, 1758 (mon.).

属征 头略宽于胸；额略宽；颜自触角之下凹入，中下部向前延伸形成长喙状。复眼裸，雄性两眼合生，雌性分离；触角正常大小，第 3 节长，芒裸。中胸背板近方形；小盾片略粗壮，近半圆形。腹部约与胸部等宽，短卵形，足简单。翅正常。r-m 脉在中室中部之前。

分布 古北区，东洋区，新北区，新热带区，非洲区。

我国有描述的种类共 5 种。

种 检 索 表

1. 颜喙黄色或黄褐色；小盾片黑色..... 2
颜喙黑色；小盾片红黄色..... 4
2. 腹部大部棕红色，第 1 节黄色，第 2、3 节后缘黑色..... 亮黑鼻颜蚜蝇 *Rh. laevigata*
腹部主要黄色或亮黑色..... 3
3. 腹部亮黑色具 3 对大的红黄色横斑..... 台湾鼻颜蚜蝇 *Rh. formosana*
腹部黄色，后缘具宽的黑色横带，前缘中部具黑色纵斑..... 黄喙鼻颜蚜蝇 *Rh. laticincta*
4. 腹部大部分黄色，第 2-4 节后缘黑色，两侧向前扩展成不明显的斑..... 黑缘鼻颜蚜蝇 *Rh. campestris*
腹部大部分黑色，第 2 和第 3 节各具 1 对红黄色横斑，前对斑大..... 四斑鼻颜蚜蝇 *Rh. binotata*

(345) 四斑鼻颜蚜蝇 *Rhingia binotata* Brunetti, 1908 (图 271)

Rhingia binotata Brunetti, 1908: 59; Knutson *et al.*, 1975: 331; Sun, 1993: 1109; Huang *et al.*, 1996: 175.

体长 12mm。

雄性 头顶三角小，黑色；额小，黑色，颜的口缘部分向前呈鼻状突出，上部黑色，下部黄色。两眼连接线长于头顶三角。触角小，红褐色。中胸背板黑色，两侧密被黄色粉被和黄色毛；小盾片黄色，半透明，被黄色毛，盾下缘纓长而密；中胸侧板密被黄色粉被和同色长毛。腹部黑色，被黄色毛；第1节背板黄色，两侧具褐色斑；第2背板具1对大的黄色横斑，斑两侧达背板侧缘，中部不相连，前缘达背板基部；第3背板基部具1对较狭的黄斑；腹部基部和两侧毛长。足除基节、腿节基部黑色外，其余黄色；腿节毛黄色，跗节上有黑刺。翅痣黄褐色。平衡棒黄色。

共检查 83 号标本：

吉林(1940.VII.13, 1个)、浙江(天目山, 1936.VIII, 1个, 1987.VII.22, 1个)、福建(黄岗山, 1981.VI.15, 2个)、湖北(神农架, 1700m, 1984.VI.29, 1个)、广东(大田顶, 1700m, 1982.IX.5, 1个)、广西(金秀, 200-1900m, 2000.VI.28, 2个; 那坡 1350m, 2000.VI.19, 1个; 防城, 340m, 1998.III.14, 1个)、四川(峨眉山, 1800-3100m, 1955.VI.17-25, 6个, 550-2000m, 1957.III.30-VIII.14, 56个; 灌县, 700m, 1986.IV.21, 1个, 1987.VII.26, 1个)、贵州(雷山雷公山, 1700-2100m, 1988.VII.2, 1个; 雷山桃江, 1000-1890m, 1988.VII.6, 1个)、云南(泸定磨西, 1550m, 1982.IX.15, 1个; 云龙志奔山, 2430m, 1981.VI.20, 1个; 温泉, 1750m, 1982.III.26, 1个)、西藏(墨脱, 850m, 1983.III.17-IV.19, 2个)、甘肃(文县, 2000-2100m, 1998.VII.1, 1个)。

分布 吉林、浙江、福建、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏、甘肃、台湾；印度，尼泊尔。




图 271 四斑鼻颜蚜蝇 *Rhingia binotata* Brunetti

a. 头 (侧面观) (head in lateral view) b. 后足 (hind leg) c. 腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

(346) 黑缘鼻颜蚜蝇 *Rhingia campestris* Meigen, 1822 (图版 V: 6)

Rhingia campestris Meigen, 1822: 259; Peck, 1988: 125; Huang *et al.*, 1996: 175.