

体长 12mm。

雄性 头顶三角小，黑色；额小，黑色，颜的口缘部分向前呈鼻状突出，上部黑色，下部黄色。两眼连接线长于头顶三角。触角小，红褐色。中胸背板黑色，两侧密被黄色粉被和黄色毛；小盾片黄色，半透明，被黄色毛，盾下缘缨长而密；中胸侧板密被黄色粉被和同色长毛。腹部黑色，被黄色毛；第1节背板黄色，两侧具褐色斑；第2背板具1对大的黄色横斑，斑两侧达背板侧缘，中部不相连，前缘达背板基部；第3背板基部具1对较狭的黄斑；腹部基部和两侧毛长。足除基节、腿节基部黑色外，其余黄色；腿节毛黄色，跗节上有黑刺。翅痣黄褐色。平衡棒黄色。

共检查 83 号标本：

吉林(1940.VII.13, 1个)、浙江(天目山, 1936.VIII, 1个, 1987.VII.22, 1个)、福建(黄岗山, 1981.VI.15, 2个)、湖北(神农架, 1700m, 1984.VI.29, 1个)、广东(大田顶, 1700m, 1982.IX.5, 1个)、广西(金秀, 200-1900m, 2000.VI.28, 2个; 那坡 1350m, 2000.VI.19, 1个; 防城, 340m, 1998.III.14, 1个)、四川(峨眉山, 1800-3100m, 1955.VI.17-25, 6个, 550-2000m, 1957.III.30-VIII.14, 56个; 灌县, 700m, 1986.IV.21, 1个, 1987.VII.26, 1个)、贵州(雷山雷公山, 1700-2100m, 1988.VII.2, 1个; 雷山桃江, 1000-1890m, 1988.VII.6, 1个)、云南(泸定磨西, 1550m, 1982.IX.15, 1个; 云龙志奔山, 2430m, 1981.VI.20, 1个; 温泉, 1750m, 1982.III.26, 1个)、西藏(墨脱, 850m, 1983.III.17-IV.19, 2个)、甘肃(文县, 2000-2100m, 1998.VII.1, 1个)。

分布 吉林、浙江、福建、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏、甘肃、台湾；印度，尼泊尔。




图 271 四斑鼻颜蚜蝇 *Rhingia binotata* Brunetti

a. 头 (侧面观) (head in lateral view) b. 后足 (hind leg) c. 腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

(346) 黑缘鼻颜蚜蝇 *Rhingia campestris* Meigen, 1822 (图版 V: 6)

Rhingia campestris Meigen, 1822: 259; Peck, 1988: 125; Huang *et al.*, 1996: 175.

体长 9mm。

雄性 头顶三角小，黑色，具同色毛；额黑色，沿眼缘及两侧密覆白色粉被，额前方中央裸，光亮；颜喙亮黑色，两侧下方具黄褐色条斑。触角基部2节褐色，第3节黄褐色，芒具微毛，黄褐色，端部色暗。中胸背板亮黑色，毛黄色，肩胛密覆白色粉被，侧缘及中侧片后缘具少许黑鬃；侧板同背板；小盾片黄褐色，毛黄色；下腋瓣和平衡棒淡黄色，端部褐色。腹部黄褐色，后缘黑色，中部狭，两侧向上扩展，背板毛黄色。足基节、转节、腿节黑色，腿节端部、胫节及跗节黄色，胫节中部具黑环；足毛大部分粗短，黑色，腿节腹面具黄色长毛。翅淡黄色。

雌性 较雄性光亮，额覆黄色粉被。

检查 9 号标本：

四川(峨眉山, 1957.VIII.27, 黄克仁, 1957.IX.17, 卢佑才, 2 个; 1800-2000m, 1957.III.25-VIII.20, 4 个、卧龙, 3250m, 1983.VIII.9, 1 个、灌县, 700-1600m, 1963.IV.24, 1 个; 万县, 1200m, 1994.V.28, 1 个)。

分布 四川; 蒙古国, 原苏联; 欧洲。

(347) 台湾鼻颜蚜蝇 *Rhingia formosana* Shiraki, 1930 (图 272, 图版 V: 7)

Rhingia formosana Shiraki, 1930: 431; Knutson *et al.*, 1975: 331; Huang *et al.*, 1996: 175.

体长 6-9mm。

雄性 头顶和额黑色，头顶三角被黑色直立毛；额覆褐黄色粉被；颜喙黄褐色或红黄色，眼缘密覆黄色粉被；颊宽，黄黑色至黑色；后头极狭，上部被1排直立黑毛。两复眼连线长。触角红黄色，第3节端部黄褐色；芒黄褐色。中胸背板黑色，被很短的黑色毛，覆灰褐色粉被，具亮黑色纵条；侧板黑色，覆灰色粉被，被黄白色毛，混有少许黑色毛；小盾片黑色，略具光泽，末端黄褐色，边缘具粗大的黑鬃。腹部亮黑色，第1节黄褐色，第2-4节各具红黄或红褐色长方形横斑，背板基部两侧被白毛。足黄褐至红黄色，翅透明，翅痣黄色。平衡棒基部黄褐色，端部淡黑色。腋瓣淡黑色。

雌性 基节、转节、腿节基部及胫节中部或多或少黑色，跗节背面黑或黑褐色。

共检查 60 号标本：

北京(小龙门, 1991.V.20, 1 个)、内蒙古(苏格河, 1957.VI.23, 1 个)、黑龙江(宁安, 1974.IX.1, 1 个)、福建(黄岗山, 1981.VI.15, 2 个)、湖北(神农架, 1700m, 1984.VI.29, 1 个, 1300m, 1994.V.5, 1 个; 武当山, 1600m, 1984.V.31, 1 个)、四川(贡嘎山, 2350m, 1983.VI.4-5, 2 个; 峨眉山, 800-2000m, 1957.IV.4-VIII.6, 24 个, 1800-2100m, 1955.VI.24, 1 个, 1986.IV.4, 2 个; 巫山梨子坪, 1500m, 1993.VII.5, 2 个; 万县王二包, 1200m, 1993.VII.12, 3 个; 南坪九寨沟, 2000m, 1987.IX.18, 1 个)、云南(思茅, 1700m, 1957.IV.5,