

1 个; 小五台山, 1200-1700m, 1964.III.23-VIII.15, 2 个)、黑龙江(哈尔滨, 1956.IV.22, 1 个)、吉林(长白山, 1987.VII.24, 1 个)、上海(1922.III.17-1933.IV.2, 9 个)、江苏(1935.IV.29-V.1, 3 个)、浙江(1919.III.18-IV.10, 3 个; 天目山, 1937.IV.28-V.8, 7 个; 舟山, 1931.V.21-25, 2 个, 1934.IX, 1 个)、江西(莲塘, 1956.I.16, 1 个)、广西(桂林良丰, 1952.III.16, 1 个)、四川(汶川, 3250-4300m, 1983.VIII.7-9, 6 个)、云南(中甸, 3100-4300m, 1981.VIII.16-1982.VII.10, 4 个)。

分布 北京、河北、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、江西、湖南、广西、四川、云南、甘肃; 原苏联, 蒙古国, 印度, 越南, 阿富汗; 欧洲。

我国有记载但未见标本的种类:

(158) 阿勒泰鼓额食蚜蝇 *Scaeva altaica* Violovitsh, 1975

Scaeva altaica Violovitsh, 1975: 178-179; Li, 1988: 41.

体长 11-13mm。

额黄色, 有黑色细毛, 额角约 90°; 颜黄色, 混杂黄、黑色细毛, 中突及口缘黑褐色。复眼裸。触角基部两节以及第 3 节背面和侧面黑褐色, 第 3 节腹面黄棕色。中胸背板墨绿色, 具金属光泽, 被稀疏黄色绒毛; 小盾片土黄色, 周缘具黄毛, 中部毛黑色。腹部黑色, 第 2-4 背板各具 1 对黄色斑块, 不伸至背板侧缘; 第 2 节背板黄色斑块略呈三角形, 第 3、4 背板黄斑新月形。前足和中足腿节基部 1/3、后足腿节基部 2/3、后足胫节均为黑褐色, 其余皆为黄棕色。(摘自 Li, 1988)

分布 新疆(玛纳斯、乌鲁木齐); 原苏联。

(159) 高加索鼓额食蚜蝇 *Scaeva caucasica* Kuznetsov, 1985

Scaeva caucasica Kuznetsov, 1985: 402-407; Li, 1988: 40.

体长 约 14mm。

雄性 额亮黄色, 密被黑色长毛; 额角约 130°; 颜淡黄色, 毛同色, 但沿两侧眼缘和中突上毛明显黑色, 且中突上黑毛与眼缘汇合, 中突和口缘黑褐色。复眼棕红色, 被淡黄色绒毛。触角黑褐色。中胸背板金属蓝色, 具光泽, 被浅黄色细毛, 中部有黑毛横带; 小盾片黄褐色, 半透明, 小盾片周缘毛黄色; 中部毛黑色。腹部背面黑色, 第 2-4 背板上各具 1 对淡黄白色斑, 均伸达背板侧缘; 第 2 背板斑不倾斜, 第 3、4 背板斑内前角后上倾斜, 两斑后缘连线交角约 130°。前足腿节基部 1/2 黑色, 腹面中央黑毛排列不规则, 中足腿节基部 1/2、后足腿节基部 5/6 黑色; 前、中、后足胫节、跗节均黄褐色。

雌性 额微突出, 其上黑毛不如雄性的长和密。(摘自 Li, 1988)