

分布 新疆；原苏联。

(160) 壮月鼓额食蚜蝇 *Scaeva dignota* (Rondani, 1857)

*Lasiophthicus dignota* Rondani, 1857: 141.

*Syrphus etnensis* van Goot, 1964: 428.

*Catabomba odessana* Paramonov, 1924: 249.

*Scaeva odessana* (Paramonov, 1924): Li, 1988: 41.

*Scaeva dignota* (Rondani, 1857): Peck, 1988: 40.

体长 12-15mm。

雄性 额黄褐色，被黑色毛，额角 95-98°，雌性额不隆起；颜土黄色，被棕色毛，口缘两侧毛黄色，中突和口缘黑褐色。复眼密被黄棕色毛。触角深褐色，第3节顶端尖。中胸背板墨绿色，具金属光泽，被黄褐色细绒毛；小盾片黄褐色，周缘毛黄褐色，中部毛黑色。腹部黑色，第2-4背板具1对黄色斑；第2背板斑中部稍凹，两端不伸达背板侧缘；第3、4节背板斑新月形，中部凹入深，两端与背板前缘距离相同，斑块伸至腹部背板侧缘。前足腿节基部1/3、中足腿节基部1/2、后足腿节几乎全部，均为黑褐色，后足胫节中部、各足跗节黑褐色，其余均为黄褐色。(摘自 Li, 1988)

分布 新疆(乌鲁木齐白杨沟)；原苏联。

(161) 黄氏鼓额食蚜蝇 *Scaeva hwangi* He, 1987 (图 118)

*Scaeva hwangi* He, 1987: 194-195; Huang et al., 1996: 154.




图 118 黄氏鼓额食蚜蝇 *Scaeva hwangi* He ♂ (仿 He, 1987)

- a. 腹部背面 (左侧) (dorsal view of abdomen, lateral of left) b. 雄性外生殖器 (genitalia) c. 雄性下生殖板 (腹侧面) (hypandrium in lateral of abdomen) d. 阳茎 (侧面) (aedeagus in lateral view) e. 翅 (wing)