

体长 10-18mm。

头顶黑色，毛黑色；额淡黄色，后缘毛黑色，长而密，触角基部上方棕色斑狭；颜黄白色，密被黄毛；正中具狭的黑色纵条；触角黑色，下缘红棕色，第3节长，上缘直，下缘稍呈弧形。中胸背板青黑色，带绿色光泽，两侧自肩胛至小盾片黄色纵条较宽，背板毛灰棕色，侧缘深黄色；侧板亮黑色，具铜色反光，被白毛；小盾片黄色，具黑长毛，基部混杂淡色毛。腹部暗黑色，第2-4背板各具1对大形黄斑；第2背板黄斑平置，第3、4背板黄斑斜置，内角与背板前缘靠近或相接；第4、5背板后缘黄色。足黄色，腿节基部黑色，胫节基部黄白色，跗节背面棕色。翅透明。

共检查26号标本：

山西(1962.VIII.26, 1个)、内蒙古(乌盟土木尔台, 1971.VII.30, 1个；二连, 1971.VII, 1个；子干旗卫井, 1971.VII.29, 1个)、四川(灌县, 700-1000m, 1963.IV.22, 1个)、新疆(和田, 1981.VI.4, 灯诱, 1个；阿克陶钦隆, 3650-3800m, 1989.VII.19, 2个；石河子, 1981.VII.2, 1个；若羌, 950m, 1960.V.5, 1个；吐鲁番, 20-140m, 1958.VI.1-24, 5个；托克逊, 76m, 1958.VI.16-17, 2个；且末, 3000m, 1988.VII.24, 5个；哈密, 1981.VI, 1个；塔什库尔干, 1987.VII.1, 1个；叶城 1987.VIII.17, 1个；温宿, 1978.VI.15, 1个)。

分布 山西、内蒙古、四川、新疆；原苏联，蒙古国，阿富汗，黎巴嫩，北非；欧洲。



图 115 大斑鼓额食蚜蝇 *Scaeva albomaculata* (Macquart)
腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

(155) 条颜鼓额食蚜蝇 *Scaeva latimaculata* (Brunetti, 1923)

Lasioticus latimaculata Brunetti, 1923: 68.

Scaeva montana Violenovitch, 1975: 173; Peck, 1985: 397.

Scaeva latimaculata (Brunetti, 1923): Knutson *et al.*, 1975: 318; Peck, 1988: 40; Huang *et al.*, 1996: 154.

体长 9-11mm。

雄性 头顶三角黑色，黑毛；额和颜淡黄色；额角为 90° ，额前部正中为棕色大形裸斑，两侧具淡色毛，后部毛刷状，黑色；颜正中条棕褐色，不达触角基部，两侧近平行，毛黄色，较长；后头灰白色，被较密的白毛，近头顶处毛黄色。触角基部两节棕红至棕褐色，第3节黑色，基部腹侧棕红色；芒橘红色。中胸背板青黑色，具光泽，两侧自肩胛至小盾片基部黄色纵条宽，达小盾片；背毛灰棕色或灰黄色；侧板黑色，具绿色光泽，被白或淡黄色毛，中侧片后上部具黄色圆斑；小盾片黄色，半透明，正中色较暗，具黑毛，和若干白毛。腹部较狭长，亮黑色，具3对大小近乎相等的橘黄色宽斑；第1对黄斑位于第2背板中部，卵形，两斑较宽分离，斑外端前角达背板侧缘；第2、3对斑分别位于第3、4背板上，近卵形，稍斜置，外端较内端宽，外侧平截状，与背板侧缘平行但明显分离，前、后缘直，内端圆，两斑较狭分离；第4背板后缘黄色或橘黄色，狭；第5背板黑色，仅两侧缘及后缘黄色；尾节橘红色，具大黑斑。足黄至红黄色，基节、转节、前足和中足腿节近基半部、后足腿节基部 $1/2-2/3$ 均为黑色，各足跗节背面棕色。翅透明。腋瓣白色。

检查标本：

西藏(日土班公湖，4200m，1981.X.7，1个)

分布 西藏(日土班公湖)；原苏联(中亚)；印度；阿富汗；伊朗。

(156) 斜斑鼓额食蚜蝇 *Scaeva pyrastris* (Linnaeus, 1758) (图 116, 图版III: 9)

Musca pyrastris Linnaeus, 1758: 594.

Scaeva rosae De Geer, 1776: 108.

Musca mellina Harris, [1780]: 80.

Syrphus transfuga Fabricius, 1794: 306.

Scaeva unicolor Curtis, 1834: 509.

Catabomba flavoscutellata Girschner, 1884: 197.

Lasopticus pyrastris (Linnaeus, 1758): Sun, 1992: 196.

Scaeva pyrastris (Linnaeus, 1758): Sun, 1987: 1181; He, 1987: 193-194; Li, 1988: 40-41; Peck, 1988: 41; Huang *et al.*, 1996: 154.

体长 10-18mm。