

体长 14.0mm。

雄性 额突出，额角为 130° ；颜毛黄色，沿眼缘及中纵条两侧毛黑色，中纵条较短。复眼被密毛。中胸背板黑色，具有很强的蓝色金属光泽，侧缘黄色；小盾片周缘被粉，其余部分具光泽，被黄色毛，后缘毛黑色。腹部第 2 节背板具黄斑，略呈三角形，斑的前侧角不向前延伸；第 3、4 节背板黄斑很宽，近似长方形，前缘微凹，3 对黄斑均未达到背板侧缘。足黄色，前、中足腿节基部的 2/5、及后足腿节的绝大部分为黑色；前足腿节端半部混有许多黑毛。(摘自 Li, 1988)

分布 西藏(日喀则)。

(162) 弯斑鼓额食蚜蝇 *Scaeva komabensis* (Matsumura, 1917)

Catabomba komabensis Matsumura, 1917: 146.

Scaeva komabensis (Matsumura, 1917): Peck, 1988: 40; He, 1992: 58; Huang *et al.*, 1996: 154.

雄性 额角约 100° 。中胸背板在翅基间有黑毛组成的横带。腹部第 3、4 节背板具 2 对新月形黄斑，斑的内、外端几乎处于同一水平面上，斑外端超过背板侧缘。3 对足的腿节具黑毛。(摘自 He, 1992)

分布 上海、江西；日本，原苏联。

(163) 南京鼓额食蚜蝇 *Scaeva nanjingensis* He et Chu, 1992 (图 119)

Scaeva nanjingensis He et Chu, 1992: 91; Huang *et al.*, 1996: 154.

体长 12.0mm。

雄性 额角为 110° ，额不甚突出；颜毛黑色，但下端被少量黄毛。复眼密被褐色毛。中胸背板黑色，微具金色光泽，被黑色毛，侧缘具黄褐色粉被及黄毛；小盾片暗黄色，被毛黑色，长，但前缘具少量黄毛。腹部第 2 节背板中部横置 1 对略呈长方形的黄斑，其外端不达背板侧缘；第 3、4 节背板各具 1 对新月形黄斑，其前缘凹入不深，斑的内、外端几处于同一水平线上，外端超过背板侧缘。足黄色，但各足基节和转节、前足腿节基部 2/5、中足腿节基部 1/2、后足腿节基部 9/10 黑色；后足胫节具 1 黑色宽中环；各足跗节中部 3 节褐色；前足腿节主要被黑毛。(摘自 He and Chu, 1992)

分布 江苏(南京)。




图 119 南京鼓额食蚜蝇 *Scaeva nanjingensis* He et Chu (仿 He and Chu, 1992)

- a. 腹部 (背面观) (abdomen of male, dorsal view) b. 雄外生殖器 (male genitalia) c. 阳茎 (侧面观) (aedeagus in lateral view)
 d. 雌性下生殖板 (腹面观) (hypandrium in ventral view) e. 上叶 (superior lobe)

34. 细腹食蚜蝇属 *Sphaerophoria* Lepeletier et Serville, 1828

Sphaerophoria Lepeletier et Serville, 1828: 513. Type species: *Musca scripta* Linnaeus, 1758 (des. Rondani, 1845: 458).

Nesosyrphus Frey, 1945: 60. Type species: *Sphaerophoria nigra* Frey, 1945.

属征 体细小至中等大小，头、胸、腹具亮黄色斑。口孔长为宽的 2 倍。复眼裸。腹侧片上、下毛斑明显分离；后胸腹板常具少许毛，极少数种类完全裸。腹部细，无边框，雄性两侧平行，雌性椭圆形。

分布 各动物地理区均有分布。

我国有描述的种类共 15 种，其中 10 种有标本。

种 检 索 表

1. 中胸背板黄色侧条达小盾片基部..... 2