

芝, 3000m, 1983.VIII.9-10, 1个)、新疆(喀什, 1335m, 1959.V.14-VII.3, 12个; 若羌, 900m, 1960.IV.30, 1个; 吐鲁番, 20-140m, 1968.VI.29, 1个; 阜康, 1910m, 1959.VI.11, 1个, 新疆其他地点从略)。

分布 北京、河北、内蒙古、黑龙江、上海、福建、广东、海南、四川、云南、西藏、甘肃、新疆、台湾; 原苏联, 蒙古国, 朝鲜, 印度, 阿富汗。




图 120 绿色细腹食蚜蝇 *Sphaerophoria viridaenea* Brunetti (仿 Sun, 1982)
腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

我国有记载而未见标本的种类:

(174) 离带细腹食蚜蝇 *Sphaerophoria abbreviata* Zetterstedt, 1859

Sphaerophoria abbreviata Zetterstedt, 1859: 6007; Peck, 1988: 42; He *et* Li, 1992: 16, 19.

小盾片毛全部或大部分黑色。腹部第 2-4 节背板黄带在中部中断, 成为 1 对横置黄斑, 腹部第 2 节两对黄斑很小。

分布 江苏。(据 He and Li, 1992)

(175) 婷婷细腹食蚜蝇 *Sphaerophoria evida* He *et* Li, 1992 (图 121)

Sphaerophoria evida He *et* Li, 1992: 18-19, Huang *et al.*, 1996: 156.

体长 8.2-8.5mm, 翅长 7.0mm。

雄性 头顶三角区黑色, 被黑毛; 额黄色, 在触角基部上方具 1 略呈三角形的褐斑;