

- 中胸背板黄色侧条仅达盾沟 8
2. 腹部第2-5背板各具1对黄斑 3
- 腹部具2或3条横带于第3、4背板或第2-4背板上 4
3. 触角黑色；腹部黄斑近三角形 黑角细腹食蚜蝇 *Sph. loewi*
 触角至少部分淡色；腹部黄斑近长方形，上侧凸，均不相连，两斑间距离自前向后逐渐加宽
 长翅细腹食蚜蝇 *Sph. menthastris*
4. 体较大，腹部明显长于翅；雄性后足腿节后腹面具短而密的黑色小鬃·短翅细腹食蚜蝇 *Sph. scripta*
 体较小，腹部等于或长于翅；后足腿节后腹面无小鬃 5
5. 雄性额黄色，无正中黑条 阿萨姆细腹食蚜蝇 *Sph. assamensis*
 雄性额黄色，有正中黑条 6
6. 雌性额正中黑条不达触角基部 印度细腹食蚜蝇 *Sph. indiana*
 雌性额正中黑条达触角基部 7
7. 颜中突明显，淡黄色，腹部第2背板正中未极宽的黄色横带 宽带细腹食蚜蝇 *Sph. macrogaster*
 颜中突小，棕黄或褐色，腹部第2背板无黄色横带 叉叶细腹食蚜蝇 *Sph. taeniata*
8. 雄性腹部两侧不平行，第5节最宽；腹部横带中断 宽尾细腹食蚜蝇 *Sph. rueppelii*
 雄性腹部两侧平行；腹部横带中断 9
9. 雄性中胸背板亮黑色，具绿色光泽 绿色细腹食蚜蝇 *Sph. viridaenea*
 雄性中胸背板黑色，略具光泽 简形细腹食蚜蝇 *Sph. cylindrical*

(164) 阿萨姆细腹食蚜蝇 *Sphaerophoria assamensis* Joseph, 1970

Sphaerophoria assamensis Joseph, 1970: 168; Knutson et al., 1975: 318; Huang et al., 1996: 156.

体长 6.9-7.8mm。

雄性 头顶黑色，额和颜黄色。触角淡黄色，第3节顶端色略暗；芒黑色。中胸背板黑色，被黄色短毛，肩胛及其后的侧纵条黄色，后者达翅基部；小盾片黄色，被黄色毛；侧板黑色，具黄斑。腹部细长；第1背板黑色；第2背板黄色，前、后缘具宽的黑带；第3节前、后缘具较狭的黑带；第4、5节黄色，尾节棕黄色。足黄色，跗节端部两节色暗。翅透明。腋瓣黄色，缘缨同色。平衡棒黄色。

共检查5号标本：

云南(西双版纳勐仑, 1988.XI.16, 1个)、西藏(米林, 3000m, 1983.VII.20, 1个, 墨脱, 1200-1600m, 1982.XII.5-30, 2个)、福建(将乐, 1991.IV.19, 1个)。

分布 云南、西藏、福建；印度。