

**(168) 宽带细腹食蚜蝇 *Sphaerophoria macrogaster* (Thomson, 1869)**

*Syrphus macrogaster* Thomson, 1869: 501.

*Sphaerophoria koreana* Bánkowska, 1964: 339.

*Sphaerophoria macrogaster* (Thomson, 1869): Knutson *et al.*, 1975: 318; Peck, 1988: 43; Sun, 1992: 1105; He *et al.*, 1992: 58; Huang, 1992: 1138; Huang *et al.*, 1996: 156.

体长 6-7mm。

雄性 头黄色，头顶三角黑褐至黑色，稍具光泽，被黑毛；额与颜淡黄色，覆白色粉被，中突明显，光亮。触角淡黄色，第3节卵形，上缘及端缘稍带棕黄色；芒棕褐色，基部棕黄色。中胸背板橄榄褐色，覆灰色粉被，黄色侧条达小盾片基部；侧板黑色，具金属光泽和黄斑；小盾片黄色，被黄白色毛，后缘常具黑色长毛。腹部较短，大部深黄色；第1背板全黑色；第2背板前、后缘黑色，正中为极宽的黄色横带；其余各背板淡色，具略明显的深色带；背板被毛淡色，各节正中与后部毛黑色，短。足黄色，跗节深黄色，端部褐色；足毛淡色，中、后足腿节及后足胫节具黑色长毛。翅略染烟色，翅痣及翅脉灰黄色。腋瓣黄白色。平衡棒黄色。

雌性 额宽，后半部亮黑色，正中黑色纵条宽约为额宽的 1/3，且达触角基部的新月形斑，额毛后半部黑色，前半部黄色。腿节端部及后足胫节基部具淡色短毛，中足腿节前侧具长黑毛。

检查 6号标本：

内蒙古(武川, 1个)、湖南(慈利, 1988.VIII.1个)、四川(马尔康, 2700m, 1983.VIII.23, 1个；武隆, 1500m, 1988.VII.1个)、贵州(江口梵净山, 800m、1988.VII.13-19, 1个, 雷山雷公山, 1988.VII.1-8.1个)。

分布 内蒙古、东北、江苏、江西、湖南、四川、贵州；原苏联，蒙古国，朝鲜，日本，印度，尼泊尔，锡兰，新几内亚，澳大利亚。

**(169) 长翅细腹食蚜蝇 *Sphaerophoria menthastris* (Linnaeus, 1758)**

*Musca menthastris* Linnaeus, 1758: 594.

*Syrphus melissae* Meigen, 1822: 326.

*Syrphus picta* Meigen, 1822: 326.

*Syrphus hieroglyphica* Meigen, 1822: 327.

*Sphaerophoria menthastris* (Linnaeus, 1758): Peck, 1988: 43; Sun, 1992, 1105; He *et al.*, 1992: 16;

Huang *et al.*, 1996: 156.