

(364) 黑条棒腹蚜蝇 *Sphegina fuscata* Shiraki, 1968

Sphegina fuscata Shiraki, 1968: 191; Peck, 1988: 149.

体长 8mm。

头顶和额黑色至黑褐色，略覆灰色粉被，额宽为头宽的 1/3；额突小，黑褐色；颜下部加宽，在触角下方凹入深，口缘突出明显，超过额突，黄色至黄褐色；颊与颜同色。触角基部 2 节橘黄色，着生于复眼中部，第 3 节黑褐色至黄褐色，长大于宽，角圆；芒黑褐色，裸而长。中胸背板黄褐色，具 3 条亮黑色宽纵条；小盾片宽为长的 2 倍，中部褐色，具宽的暗橘黄色边，后缘中央具 1 对长鬃；侧板橘黄色，中侧片前缘具黑色条斑。腹部第 1 节黑褐色，基部小盾片之下黄色；第 2 节基部狭，向后逐渐加宽，黑褐色，具 1 对三角形黄侧斑，位于背板中部之后；第 3 节橘黄色，后缘黑褐色；第 4 节后缘最宽，橘黄色；第 5 节橘黄色。足橘黄色，后足腿节膨大，基部黄色，中部和端部各具 1 宽的暗环，端半部下侧具 2 排黑色长刺；跗节黑褐色。翅黑褐色。

共检查 3 号标本：

甘肃(迭部腊子口，1700m，1980.VIII.12，1 个)、Rimogan, 1 个；1 个无采集地点。

分布 湖北、甘肃；日本。

(365) 东方棒腹蚜蝇 *Sphegina orientalis* Kertész, 1914 (图 286)

Sphegina orientalis Kertész, 1914: 73; Knutson *et al.*, 1975: 338.

体长 8mm。

头顶和额黑色，额突小，前缘褐色；颜在触角下方深凹，口上缘明显突出，远超出额突，颜上半部黑色，下半部黄色；颊黄色。触角橘黄色，第 3 节长 2 倍于宽；芒裸，长于触角。中胸背板黑色，肩胛、翅后胛及有时盾片后缘黄褐色；小盾片小，褐黑色。腹部黑色，第 1-4 节背板前缘各具宽的红黄色横带；第 1 节长略大于宽；第 2 节细长，中部最狭，基部两侧被棕黄色长毛。前、中足黄色，端跗节背面色暗；后足基节黑褐色；腿节黄褐色，近基部和端部具宽的褐黑色环，有时基部环不明显，后足腿节下侧具 2 排黑色长刺，其间具黑色短刺；胫节大部分黑褐色，基部和中部具黄环；跗节背面色暗。翅透明，翅脉处具翅晕。

共检查 8 号标本：

福建(大竹岚，1949.VI.15，1 个；建阳黄坑坳头，800-1050m，1960.IV.26，1 个)、湖北(神农架大岩屋，1700m，1984.VI.29，1 个)、广西(花坪红滩，1963.VI.12，1 个；武鸣大明山，1963.V.23，1 个)、四川(峨眉山，1955.VI.18，1 个)、Mt. Taihel. F, 1935.VI.15, 1