

上部围成 1 对心形黄斑，下部 1 梭形黄纵条，颜侧下方具 2 对黑褐色直条纹。触角基部 2 节红褐色，第 3 节红黄色。中胸背板黑色，肩胛、盾沟两端具黄斑，背板前部具 1 对狭的红褐色粉被纵条达背板 2/3 长，其下具 1 对短宽的黄色条斑达小盾沟；小盾片正中具宽黄横带，其周围黑色，后缘红褐色；侧板红褐色，2 个黄斑分别位于中侧片和腹侧片，腹侧片下部黑色。腹部背板第 1 节红褐色，后缘为极狭的黑褐色边；第 2 节红褐色，基部前侧角具三角形黄斑，两斑间有时黑褐色，近后缘具“八”字形黑褐色斑，后缘黄色宽；第 3 节红褐色，前缘黑色，近后缘为不明显的黑褐色斑，中部两侧各具 1 倒“八”字形黄粉斑，有时外侧斑不明显，后缘具黄边；第 4 节大部黑褐色，中部两侧各具 1 倒“八”字形黄粉斑，此斑较前节的大而明显，背板后缘具黄边；第 5 节和生殖节红褐色。足红褐色。翅前半部淡黄褐色。雌性额正中具 1 对黄色横斑，额两侧沿复眼边缘具 1 对黄斑。

本种与 *Sphiximorpha rachmaninovi* (Violovitsh, 1981) 颜部花纹很相似，但因未见原描述和核对原模式标本，无法确定是否是同物异名。

共检查 2 号标本：

江苏(上海, 1925.V.14, 1 个)、河南(西峡田关, 150m, 1989.V.19, 1 个)。

分布 河北、江苏、河南。




图 180 丽颜腰角蚜蝇 *Sphiximorpha bellifacialis* Yang et Cheng ♂  
a. 头部 (前面观) (head in frontal view) b. 腹部 (侧面观) (abdomen in lateral view)

(249) 短腰角蚜蝇 *Sphiximorpha brevilumbata* Yang et Cheng, 1996 (图 181)

*Sphiximorpha brevilumbata* Yang et Cheng, 1996: 169-171.

体长 13mm。

头大部红黄色；额两侧沿复眼边缘各具 1 黄斑；颜上部两侧沿眼缘各具 1 黄斑，该黄斑与额斑之间有黑色短横带相接；颜部具 3 对黑色纵斑；颜面正中和复眼正下方各为 1 对黑色直条斑，该斑上端稍宽；两侧条斑略呈“< >”形；额突短，红黄色。触角第 1 节红褐色，第 2 节短，基部黑褐色，端部及第 3 节红褐色；端芒白色。中胸背板大部黑色，两侧红褐色；肩胛及横沟两端具黄斑，后部具 1 对黄色侧条纹，位于黑色和红褐色之间；背板后缘中央具 1 红褐色斑；侧板黑色，中侧片具黄色条斑，后侧片红褐色；小盾片红褐色，前缘具红黄色横带。腹部第 1 节黑色；第 2 节黑色具红褐色斑，前侧角具狭的三角形黄斑；第 3 节基部黑褐色，其余红褐色，近后缘具黑褐色横带；第 4 节红褐色；第 2-4 节后缘黄色。足基节黑色，其余红褐色；跗节 3-5 节黑色，后足腿节基部 2/3 具黑色纵斑。翅前半部黄褐色。

共检查 2 号标本：

云南(昆明莲花池，1941.IV.4, 2 个)。

分布 云南。




图 181 短腰角蚜蝇 *Spiximorpha brevilumbata* Yang et Cheng

a. 头部 (侧面观) (head in lateral view) b. 胸、腹部 (背面观) (thorax and abdomen in dorsal view) c. 雄性外生殖器 (腹面观) (male genitalia in ventral view) d. 雄性外生殖器 (侧面观) (male genitalia in lateral view)

(250) 蜂腰角蚜蝇 *Spiximorpha polista* (Séguy, 1948) (图 182, 图版 IV: 14)

*Ceriana polista* Séguy, 1948: 161.

*Spiximorpha polista* (Séguy, 1948): Knutson et al., 1975: 346; Huang et al., 1996: 171.