

规则的黑褐色纵条及若干斑点。触角红棕色，端缘暗色；芒棕黄色，裸。中胸背板黑色，肩胛及其内侧近前缘、以及盾沟两端各具圆形黄斑，以盾沟两端斑最小，肩胛内侧斑最大，盾沟后方两侧具黄色纵斑，翅后胛黄色，背板近后缘中央具1对黄色短斜带，两带内端相接呈“^”形，背板前部为不明显的灰色粉被宽中条，沿盾沟覆灰色粉被；背板毛棕色，较长，密；小盾片黑色，后缘黄棕色，毛较长，黄色；侧板黑色，具3个黄斑分别位于肩胛侧面、前足基节上方及中侧片大部，有时腹侧片上部亦具黄斑。腹部黑色，第2-4节背板后缘黄色，第2背板近前缘、第3、4背板中部各具稍呈弓形的黄横带；第5背板暗棕红色。足棕红色至褐红色，基节棕褐色，腿节大部具轮廓不明显的褐斑，后足腿节端部腹面约1/4处具一齿。翅前部棕褐色，后部淡黄色。

共检查4号标本：

黑龙江(宁安镜泊湖, 1970.IX.3, 1个)、吉林(高岭子, 1940.VII.20, 1个；漫江, 1955.VIII.27, 1个；长白山, 850m, 1990.VII.2, 1个)。

分布 吉林、黑龙江；原苏联，蒙古。




图 350 褐翅斑胸蚜蝇 *Spilomyia maxima* Sack

a. 头部 (侧面观) (head in lateral view) b. 胸、腹部 (背面观) (thorax and abdomen in dorsal view)

(479) 黄腹斑胸蚜蝇 *Spilomyia sulphurea* Sack, 1910 (图 351, 图版 VII: 8)

*Spilomyia sulphurea* Sack, 1910: 19; Peck, 1988: 19; Huang *et al.*, 1996: 196.

体长 15mm。

头黄色，覆淡黄毛和同色粉被；头顶单眼三角区及其后部黑色，单眼区被黑色毛；额正中和颜两侧下部黑色，颜正中略带黑色；颊黑色，具黄斑。复眼棕色，具稀少的圆形黑斑，眼边缘黑褐色。触角及芒棕红色；中胸背板黑色，肩胛、肩胛内侧近前缘及盾沟两端各具圆形黄斑，但背板近后缘“Λ”形黄斑大；小盾片大部黄色，仅基部或前缘正中黑色，被黄毛；侧板黑色，具4个黄斑分别位于肩胛侧面、前足基节上方、中侧片及腹侧片上部。腹部大部分柠檬黄色，第1背板黑色；第2-4背板前缘黑色，正中向后伸展，几乎与中部黑带或黑斑相连；第2节黑色具“工”字形斑；第3节黑色前缘向后扩展呈钝三角形；腹面黑色，各节腹板后缘黄色。足大部分棕黄色，基节、转节、前足胫节及跗节黑色，后足腿节后侧具黑褐色斑。翅透明，前部具黄褐色纵斑。

检查1号标本：

新疆(莎车，1955.V.15，1个)。

分布 新疆；原苏联，阿富汗。




图 351 黄腹斑胸蚜蝇 *Spilomyia sulphurea* Sack

a. 头 (前面观) (head in in frontal view) ♂ b. 胸、腹部 (背面观) (thorax and abdomen in dorsal view)

(480) 大斑胸蚜蝇 *Spilomyia suzukii* Matsumura, 1916 (图 352, 图版 VII: 9)

*Spilomyia suzukii* Matsumura, 1916: 229; Peck, 1988: 214; Huang *et al.*, 1996: 196.

体长 20-25mm。