

头黄色，覆淡黄毛和同色粉被；头顶单眼三角区及其后部黑色，单眼区被黑色毛；额正中和颜两侧下部黑色，颜正中略带黑色；颊黑色，具黄斑。复眼棕色，具稀少的圆形黑斑，眼边缘黑褐色。触角及芒棕红色；中胸背板黑色，肩胛、肩胛内侧近前缘及盾沟两端各具圆形黄斑，但背板近后缘“Λ”形黄斑大；小盾片大部黄色，仅基部或前缘正中黑色，被黄毛；侧板黑色，具4个黄斑分别位于肩胛侧面、前足基节上方、中侧片及腹侧片上部。腹部大部分柠檬黄色，第1背板黑色；第2-4背板前缘黑色，正中向后伸展，几乎与中部黑带或黑斑相连；第2节黑色具“工”字形斑；第3节黑色前缘向后扩展呈钝三角形；腹面黑色，各节腹板后缘黄色。足大部分棕黄色，基节、转节、前足胫节及跗节黑色，后足腿节后侧具黑褐色斑。翅透明，前部具黄褐色纵斑。

检查1号标本：

新疆(莎车，1955.V.15，1个)。

分布 新疆；原苏联，阿富汗。




图 351 黄腹斑胸蚜蝇 *Spilomyia sulphurea* Sack

a. 头 (前面观) (head in in frontal view) ♂ b. 胸、腹部 (背面观) (thorax and abdomen in dorsal view)

(480) 大斑胸蚜蝇 *Spilomyia suzukii* Matsumura, 1916 (图 352, 图版 VII: 9)

Spilomyia suzukii Matsumura, 1916: 229; Peck, 1988: 214; Huang *et al.*, 1996: 196.

体长 20-25mm。

雄性 头顶亮黑色，前部密覆黄白色粉被；额棕黄色，覆与头顶同色的粉被，额前部裸；颜黄色，正中黑纵条短，轮廓不明显；头部除头顶、额两侧及颜上部被黑色毛外，其余均被黄色毛。触角棕红色，第3节色暗。中胸背板黑色，肩胛及其内侧近前缘、以及盾沟两端各具1对圆形黄斑，盾沟后方两侧具1对黄色纵斑，翅后胛黄色。背板近后缘中央具1对黄色短斜带，两带内端相接呈“Λ”形；小盾片黑色，后缘黄色；侧板具7个黄斑。腹部黑色，第1背板前角及第2-4节背板中部及后缘均具黄棕色横带，中部横带正中断裂；足橘红色，有时腿节端部略带棕褐色，前、后足胫节端半部棕褐色，前足跗节基部3节黑褐色，后足腿节端部后侧具长形黑斑。翅透明，翅痣或多或少色暗，中部略染暗色。

雌性 额正中具狭长的黑纵条，纵条前宽后狭。腹部第5背板黄棕色，各节侧缘黄色。

共检查12号标本：

北京(小龙门林场, 1991.VII.26, 1个)、河北(红松坑, 1930.VII.10, 1个)、浙江(天目山, 1936.VII.26-1947.IX.15, 7个)、江西(庐山, 1939.IX.1, 1个)、四川(峨眉山九老洞, 1800-1900m, 1957.VII.30, 1个)、陕西(佛坪东河台, 1300m, 1973.VIII.10, 1个)。

分布 北京、河北、浙江、江西、四川、陕西；原苏联(远东)，日本。



图 352 大斑胸蚜蝇 *Spilomyia suzukii* Matsumura ♀
腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

81. 粗股蚜蝇属 *Syritta* Lepeletier et Serville, 1828

Syritta Lepeletier et Serville, 1828: 808. Type species: *Musca pipiens* Linnaeus, 1758.