

(180) 金黄斑食蚜蝇 *Syrphus fulvifacies* Brunetti, 1913

Syrphus fulvifacies Brunetti, 1913: 161; Knutson *et al.*, 1975: 319.

体长 8.5-9.5mm。

头顶黑色，被同色毛；额暗黄色，覆灰色粉被和黑色毛；新月片褐色；颜黄色至棕色，被淡色粉被和毛；后头被淡色毛。触角暗褐色，第3节卵形，长大于宽，略长于基部两节之和；芒褐色，长于触角。中胸背板黑色，被黄色长毛，盾沟前两侧毛长而密；小盾片黄色，黑色毛长。腹部黑色，被淡色毛；第2节具1对较大的棕黄色或黄色斑，淡色毛长；第3、4节具到达边缘的棕黄或黄色横带，第4节后缘黄色；第5节前缘两角可见黄斑，后缘黄色。前足和中足基节、转节、以及腿节基部1/3黑色，腿节顶端2/3、胫节和跗节黄褐色；后足主要黑色，仅腿节末端、胫节基部1/3黄褐色；足毛淡色。翅透明。腋瓣黄色，毛同色。平衡棒棕色。

检查2号标本：

云南(金平，1500-1700m，1956.IV.5, 1个；昆明黑龙潭，1900m，1956.IV.5, 1个)。

分布 云南；印度(阿萨姆)，爪哇，尼泊尔。

(181) 黄颜食蚜蝇 *Syrphus ribesii* (Linnaeus, 1758) (图版 III: 12)

Musca ribesii Linnaeus, 1758: 593.

Musca vacuus Scopoli, 1763: 346.

Musca blandus Harris, [1780]: 106.

Musca tetragonus Geoffroy, 1785: 484.

Syrphus japonicus Matsumura, 1917: 31.

Syrphus jezoensis Matsumura, 1917: 32.

Syrphus kotoriensis Matsumura, 1917: 36.

Syrphus moiwanus Matsumura, 1917: 33.

Syrphus tsukisappensis Matsumura, 1917: 33.

Syrphus kuccharensis Matsumura, 1918: 29.

Syrphus maculifer Matsumura, 1918: 29.

Syrphus okadensis Matsumura, 1918: 29.

Syrphus tenuis Matsumura, 1918: 26.

Syrphus teshikaganus Matsumura, 1918: 29.

Syrphus velox Matsumura, 1918: 25.

Syrphus interruptus Ringdahl, 1930: 173.