

盾片被黑毛，前缘及两侧被黄色毛。腹部第2背板上的黄斑略呈三角形，第3、4背板各具1条黄带，黄斑和黄带的前侧角均超过背板侧缘。足大部分为黄色，各足腿节极基部黑色；前、中足第3、4分跗节褐色；后足腿节中部稍后处具宽环斑，后足胫节前侧面和跗节黑色。(摘自 He and Chu, 1996)

分布 西藏(亚东下司马)。




图 128 胡氏食蚜蝇 *Syrphus hui* He et Chu (仿 He and Chu, 1996)

a. 头 (侧面观) (head in lateral view) b. 腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view) c. 雄性外生殖器 (侧面观) (male genitalia in lateral view) d. 阴茎 (aedeagus) e. 上叶 (superior lobe)

(186) 狭额食蚜蝇 *Syrphus issikii* Shiraki, 1930 (图 129)

*Syrphus issikii* Shiraki, 1930: 378-381; Knutson *et al.*, 1975: 320.

体长 11.5-13mm。

雌性 头顶狭长，亮紫黑色，毛黑色，短；额亮黑色，覆金黄色粉被；颜狭，两侧平行，橙黄色，覆白粉被，具不达触角基部的亮黄褐色宽中条纹。触角狭长，红褐色，上缘黑色；第3节略短于基部两节之和，椭圆形，长约2倍于宽；芒较触角长，较细，端半部褐色，顶端黑色。背板亮青铜色，无纵条纹，两侧缘黄褐色，翅基部密覆黄色粉被，背板被毛长，两侧毛黄褐色；侧板橙黄色，具金属光泽，覆橙黄粉被和金黄色毛，下半部毛亮蓝黑色。小盾片绿黄色，后缘黄褐色，全被黑毛，盾下缘纓长，黄白色。腹部背板第1节橙黄色，其余各节黑色，第2-5节各具1橙黄色宽横带，达背板侧缘；第

1 横带很宽，中部略弯曲；第 2、3 横带在近前缘弯曲，第 2 横带前缘不相连，第 3 横带短相连，第 4 横带前缘长相连，后缘很弯曲；腹部毛短，黑色，基部毛长。足黄褐色，仅各足跗节、中足基节和转节、后足腿节端部 3/4 及胫节黑褐色；足毛黄色，部分毛黑色。翅略暗色，基部黄色。腋瓣灰褐色，边黄褐色，缘毛长，与边同色。平衡棒红褐色。

**雄性** 头顶明显覆黄色粉被；额前半部具中等大小的栗褐色中斑。腹部第 2 节具不到达后缘的褐色狭中纵条。(摘译自 Shiraki, 1930)

**分布** 中国台湾。




图 129 狭额食蚜蝇 *Syrphus issikii* Shiraki (仿 Shiraki, 1930)

a. 头 (前面观) (head in frontal view) b. 头 (侧面观) (head in lateral view) c. 触角 (antenna) d. 头、胸、腹 (背面观) (body in dorsal view)

(187) 硕食蚜蝇 *Syrphus magnus* He et Li, 1992 (图 130)

*Syrphus magnus* He et Li, 1992: 150-151.

**体长** 14.5mm，翅长 12mm。

**雄性** 额黑色，前半部光亮，裸露；后半部及沿眼缘覆黄色粉被及黑色毛；新月形斑褐色；颜黄褐色，除中突外，被黑色毛；颊褐色，被褐色毛。复眼密被黄白色毛，两眼连接线远长于头顶三角区的高度。触角褐色；芒黄褐色。中胸背板及侧板被褐色毛。

初二校