

个)、辽宁(高岭子, 1955.VIII.2-5, 1个)。

分布 辽宁、吉林、黑龙江。

(487) 熊蜂拟木蚜蝇 *Temnostoma bombylans* (Fabricius, 1805) (图版 VII: 14)

Milesia bombylans Fabricius, 1805: 189.

Milesia zetterstedti Fallén, 1816: 8.

Temnostoma nitobei Matsumura, 1916: 199.

Temnostoma japonicum Hull, 1944: 41.

Temnostoma bombylans (Fabricius, 1805): Peck, 1988: 216; Huang *et al.*, 1996: 198.

体长 11-14mm。

雄性 头黑色, 具光泽; 头顶单眼三角前方覆白色粉被; 额两侧密覆白色粉被, 正中光亮; 颜在额突下方直, 无中突, 两侧密覆白色粉被, 正中黑色纵条较两侧粉被纵条狭。触角黄褐色; 芒与触角同色。中胸背板黑色, 肩胛覆白色粉被, 沿盾沟具1对白色粉被横带, 背板正中具不明显的粉被中条; 侧板黑色, 中侧片后部具白色粉被纵条, 与背板横带相接; 小盾片黑色; 背板被毛短, 黑色, 盾沟两端及侧板白色较长毛。腹部黑色, 略具光泽; 第2-4节具弓形黄粉被横带, 第1条横带两端宽, 中部狭, 两端从背板中部开始, 正中至距背板前缘约1/4长, 第2、3条横带中部宽, 并近背板前缘, 横带两端狭, 向下收缩, 后2条横带等宽, 明显较第1条横带宽; 雌性第5背板具与前节相同的横带。足黑色; 前足膝部红褐色, 狭; 中、后足腿节端部、胫节及跗节红黄色, 胫节中部具暗环, 后足暗环较中足明显, 跗节端部2节色暗。翅前半部褐色, 后半部透明。

T. ravicauda He *et* Chu 的描述与本种很相似, 仅足的颜色略有不同, 由于我们未见标本, 不敢肯定是否为同种。

共检查5号标本:

吉林(高岭子, 1939.VII.4-1940.VII.13, 4个; 长白山, 850m, 1996.VII.21, 1个)。

分布 吉林; 朝鲜, 日本, 原苏联, 欧洲; 北非。

(488) 断带拟木蚜蝇, 新种 *Temnostoma ruptizona* Cheng, sp. nov. (图 357)

体长 13mm。

体裸, 似蜂。头椭圆形; 头顶和额红褐色, 被黄毛, 头顶单眼三角处黑色, 正中黑色向前延伸至额中部, 额两侧密覆黄粉被, 额突突出; 颜黑色, 两侧沿眼缘覆黄粉被; 后头黑色, 覆黄粉被和白毛。触角红褐色, 第3节大, 椭圆形; 芒与触角同色。中胸背板黑色, 具不明显的淡色粉被中条, 肩胛覆黄粉被, 沿盾沟具黄粉被横带, 背板后缘中央具黄粉被斑; 小盾片及侧板全黑色。腹部黑色, 第2-4节基部具金黄色粉被横带, 第

2 节和第 4 节横带弓形，较宽，第 3 节横带狭，中部宽中断；第 5 节前缘中部具不明显的红黄色横带，所有横带均不达背板侧缘。足细长，简单，黑色，各足膝部、中、后足胫节端部、中足跗节基部 2 节红褐色。翅前半部深褐色，后半部透明。

雄性未知。

本种与 *T. bombylans* 相近，但后者腹部第 3 节背板横带中部不中断，第 3、4 节横带等宽，腹部横带黄色；中、后足跗节红黄色，仅端部 2 节色暗。

正模：♀，云南泸水姚家坪，2500m，1981.VI.2，张学忠采。




图 357 断带拟木蚜蝇，新种 *Temnostoma ruptizona* Cheng, sp. nov.
腹部 (abdomen)

(489) 胡拟木蚜蝇 *Temnostoma vespiforme* (Linnaeus, 1758) (图 358, 图版 VII: 15)

Musca vespiformis Linnaeus, 1758: 593.

Spliomyia jozankeanum Matsumura, 1916: 197.

Temnostoma vespiforme (Linnaeus, 1758): Peck, 1988: 217.

体长 15-21mm。

雄性 头顶黑色，被黑毛，单眼三角前覆黄色粉被；额黑色或红褐色，两侧密覆黄粉被，额正中光亮；颜在触角下略凹入，无中突，两侧密覆黄粉被，正中黑中条光亮，狭；颊黑色或黑褐色，裸；后头覆黄粉被和淡褐色毛。触角红褐色或红黄色；芒与触角同色。中胸背板黑色，具不明显的灰白色粉被中条，背板具下列黄色粉被斑：肩胛具 1 对圆形斑，沿盾沟具 1 对横带，翅后胛及其上方具 1 对侧条，该侧条上端细，下端宽，近狭三角形，背板后缘正中具 1 三角形黄斑；小盾片黑色，基半部暗，端半部具光泽；侧板黑色，中侧片后部具黄粉被纵斑，与背板横带相连；背板毛褐色，短，背板边缘、