

(520) 六斑蜂蚜蝇 *Volucella nigropicta* Portschinsky, 1884 (图 376)

*Volucella nigropicta* Portschinsky, 1884: 127; Peck, 1988: 130; Huang *et al.*, 1996: 202.

*Volucella sexmaculata* Matsumura, 1916: 212.

体长 16-20mm。

体被毛少，形如胡蜂。头黄色，毛同色；雄性复眼密被淡棕色毛，下部毛稀少。颜裸，中突覆鬃状短毛；触角橘红黄色。中胸背板黑褐色，前部正中自前缘至盾沟具 1 对淡粉被纵条，肩胛黄色，翅后胛棕黄色，背板侧缘及后缘具黑长鬃；小盾片褐色至黑褐色，毛黑色，短，后缘具黑长鬃；侧板黑色，具大的黄斑。腹部基部宽，末端尖，第 1 背板大部分黑褐色，第 2-4 背板黄棕色，正中各具 1 对黑褐色或棕褐色斑，以第 2 节斑最大，第 4 节斑最小，有时第 4 节斑不明显，黑斑各与基背板后缘相连或接近，露尾节棕黄色。足黄色至棕褐色，中足腿节后侧具若干黑鬃。翅透明，前部正中及近端部各具轮廓不明显的暗斑。

共检查 12 号标本：

北京(小龙门林场, 1991.VII.24-26, 2 个)、河北(红松坑, 1930.VII.7, 2 个)、浙江(天目山, 1937.VI-VII.20, 4 个)、甘肃(1920.VII.21, 1 个; 文县, 900-1450m, 1998.VI.25, 1 个; 康县, 1450-1650m, 2 个)。

分布 北京、河北、浙江、甘肃; 原苏联, 日本。




图 376 六斑蜂蚜蝇 *Volucella nigropicta* Portschinsky ♀

a. 头部 (侧面观) (head in lateral view) b. 腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)