

第4背板斑与第3节相似,但较小.....圆斑宽扁蚜蝇 *X. comtus*

(53) 圆斑宽扁蚜蝇 *Xanthandrus comtus* (Harris, 1780) (图版 II : 4)

Musca comtus Harris, 1780: 108.

Scaeva hyalinatus Fallén, 1817: 43.

Syrphus quadriguttulus Matsumura, 1911: 78.

Epistrophe reductus Čepélak, 1940: 34.

Epistrophe undulatus Čepélak, 1940: 34.

Xanthandrus comtus (Harris, 1780): Knutson *et al.*, 1975: 326; Peck, 1988: 68; He, 1992: 58; Huang *et al.*, 1996: 129.

体长 8-11mm。

雄性 头顶三角黑色,被黑毛;额前部亮黑色或蓝黑色,后部密被淡黄色粉被及黑毛;颜与额同色,除中突外密覆灰白色粉被及淡色短毛。触角较大,棕黄至棕红色,第3节明显长大于宽,上侧及端部或多或少深棕色,有时几乎全部暗色。中胸背板、侧板及小盾片黑色,具暗绿色光泽,毛淡棕色。腹部暗黑色,基部和端部具光泽;第2背板具1对颇大的圆形棕红色斑,两斑相距较远,有时圆斑缩小;第3背板棕红色斑很大,前部相接,后部分开,整个背板仅侧缘及后缘黑色;第4背板斑与前节相似,但较小,略超过背板之半;腹部被淡黄色毛,黑色部分毛黑色。足棕黄色至棕褐色,前、中足胫节基部及腿节端部棕黄色。翅透明。

雌性 头顶与额黑或蓝黑色,具光泽;额中部具淡色粉被宽横带,两侧粉被延伸至颜部。腹部较雄性宽大,斑较雄性小,第2背板有时完全无斑;背板覆青灰色粉被。

检查 25 号标本:

北京(1937.VIII.12, 2个)、内蒙古(乌盟土木尔台, 1971.IX.3, 1个; 锡林浩特, 1971.VI.22, 1个; 二连, 1971.VII.23, 4个; 东乌旗, 1971.VIII.24, 2个)、吉林(1939.VII.15, 1个)、江苏(无锡, 1950.X.18, 1个)、浙江(天目山, 1936.IV.30-X.6, 5个; 西天目山, 1937.I.15, 1个; 莫干山 1936.IV.30-V.14, 4个)、福建(建阳黄坑桂林, 270m, 1960.IV.4, 1个)、广东(广州, 1957.III.25, 1个)、四川(峨眉山报国寺, 1957.III.28, 1个)。

分布 北京、内蒙古、吉林、江苏、浙江、福建、广东、四川、台湾; 原苏联, 蒙古国, 朝鲜, 日本; 欧洲。

(54) 短角宽扁蚜蝇 *Xanthandrus talamaui* (de Meijere, 1924) (图 46)

Melanostoma talamaui de Meijere, 1924: 21.

Xanthandrus brevicornis Curran, 1928: 263.