

背板前缘、后缘和侧缘黑褐色，前缘中部并向后延成三角形，第3背板后半部具大三角形淡黑褐色斑；第4背板黑褐色，第2-4背板均具光泽；腹背被毛黄白色，以基部两侧的毛较长。后足转节具短距，后足腿节中等膨大，长度约为宽度的4倍，由较粗刺组成的前、后侧刺列布满整个腹缘，其中基部1/2的刺列较密而乱；后足胫节端部具1不明显的突起。足大部分黑色，只有前足腿节最端部，前、中足胫节基部2/5和端部1/5，后足胫节基部1/3，以及前、中足基部第1、2跗节和后足第2跗节黄色。翅呈淡烟褐色。腋瓣淡黄白色，边缘及缨毛淡黄色。平衡棒基半部褐色，端半部黄褐色。(摘自 He and Chu, 1992)

分布 黑龙江(宁安江山娇林)。

注: Mutin (1999) 认为该种是 *Xylota tarda* 的同物异名，由于我们未见标本，不能确定该同物异名是否成立。

(563) 黑颜木蚜蝇 *Xylota armipes* (Sack, 1922)

Xylota armipes Sack, 1922: 269; Knutson *et al.*, 1975: 366; He, 1992: 2.

体长 16-17mm。

头顶很狭长，亮黑色，被黄色短毛；额亮黑色，边缘毛白色；颜黑色，覆白粉被，口缘裸。触角黑色；第3节略呈褐色；芒略暗褐色，基半部黄色。中胸背板黑色，具铜色光泽，被褐色短毛，具2条明显的黄色纵纹，肩胛具强光泽，被黄色长毛，翅前胛毛黄褐色，长；小盾片略横宽，边明显，淡绿色，毛淡黄褐色，长；侧板黑色，覆灰色粉被，中部具白黄色毛带。腹部略具光泽，黑色；第1节微亮铜色；第2节具大的淡紫色侧斑，基部两侧毛很长；第3节基部具很宽的近中部几乎中断的淡紫色横带，后缘略弯曲；第4节基部1/3很拱起，整个淡紫色。翅略呈褐色；腋瓣和平衡棒淡橙黄色，略覆蓝粉被。足亮黑色，前足腿节端部略红褐色，前、中足胫节淡棕黄色，后足胫节基部1/3黄色，后足跗节黑褐色；前足腿节中部下面具1个短圆形突起；胫节被很多淡色长毛，外侧毛特别长；中足腿节中部粗，基半部下面具1个长隆脊，中足胫节中部适当弯曲，外缘下侧具特别长的缨毛和1簇黄白色毛，基半部下侧顶端具5枚短黑色小刺；后足转节顶端长，近后面同样具刺；后足腿节很粗和弯曲，下侧端半部具一些小突起，腿节总有短刺，近基部具4个暗色长、粗刺，毛长，白色；后足胫节很弯曲，下侧顶端具1个钝宽的突起，中部上侧后面具1个齿状突起，中部内侧为1个长黄毛簇；

雌性 足细，毛短，无突起和缘缨以及毛簇，后足腿节下侧具许多小刺。(摘自 Shiraki, 1930)

分布 中国台湾。