

吉林(长白山, 900m, 1983.VIII.9, 1个)。

分布 吉林。

(550) 黑腹木蚜蝇 *Xylota coquilletti* Hervé-Bazin, 1914 (图 399)

*Xylota coquilletti* Hervé-Bazin, 1914: 408; Knutson *et al.*, 1975: 367; Peck, 1988: 225; He *et* Chu, 1992: 2; Huang *et al.*, 1996: 212.

*Xylota cuprina* Coquillett, 1898: 327.

*Xylota silvicola* Mutin, 1987: Mutin *et al.*, 1999: 50.

体长 10-12mm。

体黑色, 略具古铜色光泽。头顶黑色, 被黄色长毛; 额及颜密覆黄粉被, 额前端棕褐色, 裸; 雌性额中部覆黄白色粉被斑。雄性两眼连线约与头顶三角等长。触角基部 2 节黑色, 第 3 节棕色。中胸背板及小盾片黑色, 具光泽, 肩胛内侧覆黄白色粉被斑; 小盾片具边, 背板毛金黄色; 侧板棕色, 毛棕红色。腹部长于头、胸之和, 狭于胸部, 褐至黑色, 有时略带棕色; 第 1 背板铜黑色; 第 2、3 背板两侧各具三角形古铜色或略带绿色侧斑; 腹背毛棕黄色, 短, 腹面毛黄色, 直立, 稀。足黑色, 前、中足膝部、胫节基半部有时末端、跗节基部 1-3 节、后足胫节基部 1/3 黄色; 足被黄毛, 后足腿节前、后腹面具黑色短刺, 雄性转节腹面具 1 短刺。翅透明, 翅痣棕色。腋瓣黄白色。平衡棒黄色至红黄色。

外来鉴定标本, 无具体信息。

分布 黑龙江、台湾; 原苏联(远东), 日本。




图 399 黑腹木蚜蝇 *Xylota coquilletti* Hervé-Bazin ♂

后足 (hind leg)