

大，向端部变细，侧内平，下侧中部向下扩大，其上具 6 根黑刺和 1 簇长粗的黄毛，近端部具 2 排粗大的黑刺，上外侧具相似的刺；胫节黑褐色，明显弯曲，基部黄色狭。

检查 2 号标本：

云南(西双版纳勐腊，620-700m，1959.V.29，1 个；思茅，1200m，1957.V.11，1 个)。

分布 云南；印度。

### (556) 缓木蚜蝇 *Xylota segnis* (Linnaeus, 1758)

*Musca segnis* Linnaeus, 1758: 595.

*Musca maritima* Scopoli, 1763: 344.

*Musca fucata* Harris, [1780]: 83.

*Musca maritima* Scopoli, 1763: Synonymized by Thompson, 1993: 162.

*Musca brassicaris* Donovan, 1796: 17.

*Musca confracta* Geoffroy, 1785: Synonymized by Thompson, 1993: 162.

*Musca melanochrysa* Gmelin, 1790: Synonymized by Thompson, 1993: 162.

*Xylota segnis* (Linnaeus, 1758): Peck, 1982: 226; He *et* Chu, 1992: 2.

体长 8-13mm。

头黑色，颜和额密覆黄白色粉被。触角黑褐色，第 3 节黄褐色；芒黄褐色，长。中胸背板黑色，具金属绿色光泽，肩胛内侧具白色大粉被斑，背板被毛短、密，黄色；侧板毛白色，长；小盾片同背板，后缘毛黄色，长。腹部黑色，第 2 和第 3 节大部橘红色，第 2 节中部色暗或具黑色中线；腹部毛黄色，基部两侧毛长，第 4 节后缘及腹末毛黑色。足黑色；前、中足胫节黄色，中部具界限不明显的褐色宽环，跗节基部 3 节黄色，后足胫节基部 2/5 黄色，跗节中部 2 节黄色；雄性后足转节具细长的刺突，腿节略粗大，腹面外侧从基部至端部具 1 排黑刺，端部内侧具 1 排同样的刺，胫节明显弯曲；足毛白色。翅略带褐色，缘室及翅痣淡褐色。

共检查 2 号标本：

吉林(高岭子，1940.VII, 1 个)、陕西(宁陕，1700m，1979.VII.29, 1 个)。

分布 东北、吉林、陕西；原苏联；欧洲，北非，北美洲。

### (557) 西伯利亚木蚜蝇 *Xylota sibirica* Loew, 1871

*Xylota sibirica* Loew, 1871: 236; Peck, 1988: 226; He *et* Chu, 1992: 2; Sun, 1993: 1113; Huang *et al.*, 1996: 215.

体长 14-15mm。