

大，向端部变细，侧内平，下侧中部向下扩大，其上具 6 根黑刺和 1 簇长粗的黄毛，近端部具 2 排粗大的黑刺，上外侧具相似的刺；胫节黑褐色，明显弯曲，基部黄色狭。

检查 2 号标本：

云南(西双版纳勐腊，620-700m，1959.V.29，1 个；思茅，1200m，1957.V.11，1 个)。

分布 云南；印度。

(556) 缓木蚜蝇 *Xylota segnis* (Linnaeus, 1758)

Musca segnis Linnaeus, 1758: 595.

Musca maritima Scopoli, 1763: 344.

Musca fucata Harris, [1780]: 83.

Musca maritima Scopoli, 1763: Synonymized by Thompson, 1993: 162.

Musca brassicaris Donovan, 1796: 17.

Musca confracta Geoffroy, 1785: Synonymized by Thompson, 1993: 162.

Musca melanochrysa Gmelin, 1790: Synonymized by Thompson, 1993: 162.

Xylota segnis (Linnaeus, 1758): Peck, 1982: 226; He *et* Chu, 1992: 2.

体长 8-13mm。

头黑色，颜和额密覆黄白色粉被。触角黑褐色，第 3 节黄褐色；芒黄褐色，长。中胸背板黑色，具金属绿色光泽，肩胛内侧具白色大粉被斑，背板被毛短、密，黄色；侧板毛白色，长；小盾片同背板，后缘毛黄色，长。腹部黑色，第 2 和第 3 节大部橘红色，第 2 节中部色暗或具黑色中线；腹部毛黄色，基部两侧毛长，第 4 节后缘及腹末毛黑色。足黑色；前、中足胫节黄色，中部具界限不明显的褐色宽环，跗节基部 3 节黄色，后足胫节基部 2/5 黄色，跗节中部 2 节黄色；雄性后足转节具细长的刺突，腿节略粗大，腹面外侧从基部至端部具 1 排黑刺，端部内侧具 1 排同样的刺，胫节明显弯曲；足毛白色。翅略带褐色，缘室及翅痣淡褐色。

共检查 2 号标本：

吉林(高岭子，1940.VII, 1 个)、陕西(宁陕，1700m，1979.VII.29, 1 个)。

分布 东北、吉林、陕西；原苏联；欧洲，北非，北美洲。

(557) 西伯利亚木蚜蝇 *Xylota sibirica* Loew, 1871

Xylota sibirica Loew, 1871: 236; Peck, 1988: 226; He *et* Chu, 1992: 2; Sun, 1993: 1113; Huang *et al.*, 1996: 215.

体长 14-15mm。

体黑色。雄性头顶三角长，单眼三角着生很前，头顶黑色，光亮，被黄褐色长毛；额和颜黑色，密覆白粉被，额前方中央裸。触角黑色，第3节覆褐色粉被；芒黑色，裸。中胸背板黑色，具细刻点，略覆褐色粉被，被短黄毛；小盾片同背板，盾下毛密，白色；侧板黑色，覆红褐色粉被和白毛。腹部明显长于头、胸部，黑色，具紫铜色光泽，毛黄色，短；雄性后足转节刺突粗大，腿节稍粗大，直，腹面具小黑刺，端部具侧刺脊，其上刺较粗大。足黑色，前、中足胫节基部、后足胫节基半部黄褐色或红褐色，各足跗节基部2节红褐色或红黑色；足毛短，大多数淡色，前、后足跗节背面密被黄短毛。翅基半部透明，端半部淡黑色。

共检查7号标本：

四川(峨眉山, 1800-2000m, 1957.VII.6-VIII.20, 4个)、云南(泸水片马, 2300m, 1981.V.26, 1个；维西攀天阁, 2920m, 1981.VIII.22, 1个)、西藏(墨脱, 1300-1700m, 1998.XI.20, 1个)。

分布 四川、云南、西藏(墨脱)；原苏联，蒙古国。

(558) 肖普通木蚜蝇 *Xylota spurivulgaris* Yang et Cheng, 1996 (图 403)

Xylota spurivulgaris Yang et Cheng, 1996: 215.

体长 9mm。




图 403 肖普通木蚜蝇 *Xylota spurivulgaris* Yang et Cheng ♂

a. 雄性外生殖器(腹面观)(male genitalia in ventral view) b. 雄性外生殖器(左侧面观)(male genitalia of left side in lateral view) c. 雄性外生殖器(右侧面观)(male genitalia of right side in lateral view)

雄性 头黑色，具光泽；头顶三角长，被黄长毛，单眼三角着生很前；额和颜两侧覆粉被。触角基部2节黑色，第3节黄褐色。中胸背板黑色，被少量淡色毛；侧板黑色，被白长毛；小盾片盾下毛稀少。腹部收缩，第2、3节交界处最狭；背板黑色，两侧具长毛，第2-4节具橘黄色斑，第3节斑明显。后足转节具瘤状突起，腿节粗大，腹面具前、后两排侧刺脊，胫节弯曲，基腹面具带刺的中脊，约1/3于胫节长；足黑色；胫节基部