

雄性外生殖器爪形突背面观强烈由基部向端部变窄, 末端稍扩大, 侧面观则显粗壮; 抱器瓣末端很钝, 孔穴大, 长椭圆形, 很明显; 囊形突亚椭圆形(背面观)。

分布 四川、云南。

中国亚种与分布

(a) 贝娜绢粉蝶指名亚种 *Aporia bernardi bernardi* Koiwaya, 1989 (图版 IX: 19)

Aporia bernardi bernardi Koiwaya, 1989, *Stu. Chin. Butt.*, 1: 200, figs. 206—207, 214—215, 654, 657, 699, 712.

翅展♂50—54mm。

观察标本: 四川马尔康一道坪 2230m, 14♂♂, 1961.VI.1—15, 李锁富采; 理县 1800—2000m, 2♂♂, 1964.V.24—28, 张学忠采; 康定二道桥 2500m, 1♂, 2004.VI.19, 魏忠民采。

分布: 四川、西藏。

(b) 贝娜绢粉蝶云南亚种 *Aporia bernardi yunnanica* Koiwaya, 1989 (图版 IX: 20)

Aporia bernardi yunnanica Koiwaya, 1989, *Stu. Chin. Butt.*, 1: 202, figs. 208—209, 216—217, 654, 657, 712.

明显比指名亚种大而暗。前翅正面的剑状纹、黑色外缘带及中室端斑都比指名亚种明显。

观察标本: 云南中甸, 1♂, 2004.V.27, 黄灏采(存黄灏处); 维西, 1♂, 1995.V.24, 湛安明采(存袁峰处); 碧塔海, 1♀, 1998.VI.20, 罗箭采(存罗箭处)。

分布: 云南(丽江、德钦、中甸)。

(c) 贝娜绢粉蝶汶川亚种 *Aporia bernardi giacomazzoi* Della Bruna, Gallo et Sbordoni, 2003 stat. nov.

Aporia giacomazzoi Della Bruna, Gallo et Sbordoni, 2003, *Fragmenta entomologica*, 35: 134.

外形与贝娜绢粉蝶以上两亚种相似, 但翅正面的黑纹在前翅要密集得多, 黑纹与底色形成鲜明对比; 内缘形成完整的黑色纵带; 中室端斑宽, 中室内白色; 外缘区黑色鳞片密集, 但其中的剑状纹仍然清晰可见。后翅的中室较长, A 到 M₁ 脉端部的黑边逐渐加宽。后翅反面的剑状纹更接近外缘。

观察标本: 作者未见标本。

分布: 四川(汶川)。