

1枚黄斑。

观察标本：云南永善 3300m, 1♀, 1980.VII.14, 李文华采；巧家 2200m, 5♂♂, 1980.VI.16, 刘洪伦采；永平至保山 1250m, 1♂, 1955.V.5, 波波夫采；维西攀天阁 2920m, 1♂, 1981.VII.18, 廖素柏采。

分布：四川(康定、芦山)、云南(Gad-ssu-Be-ta、永善、巧家、维西、永平)。

(c) 普通绢粉蝶西北亚种 *Aporia genestieri pseudopotanini* Bernardi, 1962 (图版 IX: 8)

*Aporia genestieri pseudopotanini* Bernardi, 1962, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 67(7/8): 178, figs. 3,7.

体型较小，翅较圆。翅正面的外缘黑斑在雄蝶中只出现在前翅的顶角区，在雌蝶中通常浅而淡。后翅反面基部有黄斑。

观察标本：陕西周至厚畛子 1350m, 2♂♂, 1999.VI.25, 朱朝东、姚建采；宁陕火地塘 1580—1650m, 1♂, 1999.VI.26, 袁德成采。山西太谷, 2♂♂, 1975.VI, 庞震采, 3♂♂1♀, 1965.V.27, 宋寅德采, 1♀1♂, 1964.VI.3, 赵庆贺采。甘肃文县邱家坝 1250m, 1♂, 1998.VI.28, 姚建采；文县碧口碧峰沟 900—1450m, 1998.VI.25, 王书永采。湖北神农架松柏 900m, 1♂, 1981.VI.10, 韩寅恒采。四川万县王二包 1200m, 1♂, 1993.VII.11, 姚建采；都江堰(灌县)700—1000m, 4♂♂, 1954.VI.15—19, 张学忠采；雅安碧峰峡 1100m, 1♂, 2004.VI.17, 魏中民采。

分布：湖北(神农架)、河南(济源)、四川(北部)、陕西(秦岭)、山西、甘肃(中西南部)。

(d) 普通绢粉蝶台湾亚种 *Aporia genestieri insularis* Shirôzu, 1959

*Aporia hippia insularis* Shirôzu, 1959, *Kontyu*, 27: 92.

*Aporia potanini insularis* Shirôzu: Chou, 1994: 249.

*Aporia hippia taiwana* Matsumura, 1919, *Thous. Ins. Addit.* 3: 497.

*Aporia genestieri insularis* Shirôzu: Della Bruna *et al.*, 2004: 31.

与伪指亚种相似，但体型稍小。

分布：台湾。

说明：本亚种作为小槩绢粉蝶 *Aporia hippia* (Bremer) 的亚种发表，随后被转移到灰翅绢粉蝶 *Aporia potanini* Alpheraky 中。Della Bruna *et al.*(2004) 根据其外形和雄性外生殖器结构特征将其归入普通绢粉蝶 *Aporia genestieri* (Oberthür) 中。

(86) 等距绢粉蝶 *Aporia howarthi* Bernardi, 1961 (图 97)

*Aporia howarthi* Bernardi, 1961, *Revis. Fr. Ent.*, 28: 90, figs.