

中国亚种与分布

(a) 三黄绢粉蝶指名亚种 *Aporia larraldei larraldei* (Oberthür, 1876)

Pieris larraldei Oberthür, 1876, *Étud. Ent.*, 2: 19, pl. 1, figs. 2a—b.

Aporia larraldei larraldei (Oberthür): Della Bruna et al., 2004: 60.

后翅的白色比例大于其他亚种。

观察标本：四川米易 2000m, 1♂, 1982.VI.14, 朱建华采。

分布：四川(宝兴、米易)。

(b) 三黄绢粉蝶高黎贡亚种 *Aporia larraldei kaolinkonensis* Yoshino, 1997 (图版 XI: 9)

Aporia larraldei kaolinkonensis Yoshino, 1997, *Neo. Lep.*, (1)2: 1, figs. 5—7.

后翅反面黄色，但中室内白色；亚外缘白斑的内缘不呈锯齿状。

观察标本：云南云龙志奔山 2250m, 1♂, 1981.VI.25, 廖素柏采。

分布：云南(高黎贡山、云龙)。

(c) 三黄绢粉蝶云南亚种 *Aporia larraldei nutans* (Oberthür, 1892) (图版 XI: 10)

Pieris larraldei f. nutans Oberthür, 1892, *Étud. Ent.*, 16: 6, pl. 1, fig. 3.

Aporia larraldei nutans (Oberthür): Della Bruna et al., 2004: 60.

后翅反面黄色；亚外缘白斑的内缘呈锯齿状。

观察标本：云南永善 2000m, 1♂, 1984.VIII.7, 郭友礼采；中甸上官村 2900m, 1♂, 1984.VIII.7, 刘大军采。

分布：云南(中甸、永善)。

(d) 三黄绢粉蝶卧龙亚种 *Aporia larraldei shizuyai* Koiwaya, 1996

Aporia larraldei shizuyai Koiwaya, 1996, *Stud. Chin. Butt.*, 3: 239, figs. 1—4.

翅面白色比例大于其他亚种，前翅亚外端 m_3 室的白斑中室存在，后翅亚外缘的黑纹模糊。

观察标本：作者未见标本。

分布：四川(汶川)。