

(c) 黑脉园粉蝶西南亚种 *Cepora nerissa dapha* (Moore, [1879]) (图版 XII: 2, 3)

*Appias dapha* Moore, [1879], *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1878 (4): 838.

*Cepora nerissa dapha* (Moore): Corbet *et* Pendlebury, 1992: 187.

*Huphina nerissa dapha* (Moore): Fruhstorfer, 1910, In Scitz, *Macrolep. World*, 9: 141.

*Cepora nerissa yunnanensis* Mell, 1943, *Zoologica, Stuttgart*, 36: 98.

个体稍小, 雄蝶前后翅反面的基半部黄绿色, 翅脉上的条纹倾向褐色。雌蝶翅面底色为白色。

观察标本: 云南西双版纳大勐龙 650m, 3♂♂2♀♀, 1958.IV.9—VIII.5; 大勐龙 700m, 1♀, 1957.IV; 易武版纳勐仑 650m, 1♀, 1959.VIII.25; 西双版纳勐仑 600—650m, 2♀♀, 1994.IV.20—XI.2 勐混 750m, 1♂, 1958.VI.4; 勐遮 870—1200m, 1♂1♀, 1958.VII.11—VIII.31; 小勐养 850m, 1♂1♀, 1958.VII.10—IX.2; 西双版纳勐啊 1050—1080m, 1♂, 1958.VIII.21; 橄榄坝 560m, 1♂, 1958.VII.10; 河口 200m, 2♂♂, 1956.V.14; 河口小南溪 200m, 1♂, 1956.VI.12; 金平猛喇 400m, 2♀♀, 1956.IV.28; 石屏牛街 1300m, 1♀, 1979.VII.3; 保山 1600m, 1♂5♀♀, 1955.V.13; 景东 1170m, 11♂♂5♀♀, 1956.V.22—VI.27; 景东 1200m, 2♂♂1♀, 1955.IV.22—28; 景东董家坟 1250m, 12♂♂3♀♀, 1956.VI.12—19; 景东无量山 1500m, 2♂♂, 1982.V.21; 昆明西山, 1♂1♀, 1941.IV; 昆明西山 2100m, 1♀, 1958.III.23; 昆明 1900m, 1♂, 1956.VI.12; 昆明市 1200m, 1♂, 1980.V.5; 思茅 1300m, 1♀, 1957.II.13; 永德 1661m, 1♀, 1980.V.26。广西龙州 140m, 2♀♀, 1963.IV.30; 宁明陇瑞, 1♀, 1984.V.20; 那坡德孚 1350m, 1♂, 2000.VI.18; 梧州, 1♂, 1934.VIII.2。

分布: 广西、云南; 缅甸, 越南, 老挝, 泰国, 马来西亚。

(d) 黑脉园粉蝶台湾亚种 *Cepora nerissa cibyra* (Fruhstorfer, 1910)

*Huphina cibyra* Fruhstorfer, 1910, In Scitz, *Macrolep.*, 9: 141.

*Cepora nerissa cibyra* (Fruhstorfer): Chou, 1994: 255.

别名: 东南亚种。

后翅反面翅脉上的条纹灰色, 并且时断时续, 湿季型也是如此, 前翅反面顶角色淡。

分布: 台湾。

(111) 青园粉蝶 *Cepora nadina* (Lucas, 1852) (图 124)

*Pieris nadina* Lucas, 1852, *Revue Mag. Zool.*, (2)4: 333.

*Cepora nadina* (Lucas): Chou, 1994: 256.