

Delias lativitta shaanxiensis Chou, Zhang et Wang, 2001, *Entomotaxonomia*, 23(1): 38—46.

雄蝶翅表斑纹较粗，中室内长斑明显，前翅 r_s 、 m_1 、 m_2 、 m_3 、 cu_1 室的中域斑与亚外缘斑相连；后翅臀角斑为亮黄色，不延伸到翅基部，内缘近白色。

观察标本：陕西周至厚畛子，1♂，1999.VI.25；四川康定 1♂，2005.VI。

分布：四川（康定）、陕西（宁陕、周至）。

(b) 侧条斑粉蝶台湾亚种 *Delias lativitta formosana* Matsumura, 1909(图版 VI: 8)

Delias lativitta formosana Matsumura, 1909, *Ent. Zeit.*, 23: 92.

雄蝶翅面黑褐色，斑纹较粗，前翅中域斑不与亚外缘斑相连；后翅正面肩斑和臀斑以及内缘都为深黄色。两对翅的亚缘白斑比指名亚种大。

观察标本：台湾 Chiponson, 1♂, 1935.VI.5。

分布：台湾。

(c) 侧条斑粉蝶云南亚种 *Delias lativitta yunnana* Talbot, 1937

Delias lativitta yunnana Talbot, 1937, *Monogr. Delias*: 268.

Delias lativitta tai Yoshino, 1999, *Neo Lepidoptera*, 4: 1—10.

雄蝶翅面斑纹极细，且不明显，中室内长斑模糊；亚外缘斑较小，后翅亚外缘的蓝灰色鳞粉较少，内缘橙黄色，反面 r_s 、 m_1 、 m_2 室的中域斑极小。

观察标本：云南西双版纳勐腊，1♂，1995.X。

分布：云南（西双版纳）；泰国，老挝。

(d) 侧条斑粉蝶不丹亚种 *Delias lativitta parva* Talbot, 1937(图版 VI: 9)

Delias lativitta parva Talbot, 1937, *Monogr. Delias*: 268; Wei et Wu, 2005, *Acta Ent. Sinica*, 48(1): 114.

雄蝶翅正面斑纹比指名亚种 *D. lativitta lativitta* 细，但比云南亚种 *D. lativitta yunnana* 粗，亚外缘斑较小，前翅中室内白色长斑上有少量的黑色鳞粉， r_{4+5} 、 m_1 、 m_2 室的中域斑与亚外缘斑相连， m_3 、 cu_1 室的中域斑与亚外缘斑不相连；后翅正面内缘为橙黄色，外缘蓝灰色鳞粉较多，将亚外缘斑覆盖。

观察标本：云南宾川鸡足山 2450m, 1♂, 1982.VI.15；云龙志奔山 2550m, 1♂, 1981.VI.22。

分布：云南（宾川、云龙）；不丹，缅甸。