

slide NO. 17292); 1♂, syntype, Porten, Hainan, July 1904, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1; 1♂, Assam-Naga, 9<sup>bre</sup>, 1889, W. Doherty (BMNH slide NO. 17296); 1♂, West Java, 1892 (BMNH slide NO. 17290).

**分布:** 广东、海南、云南; 印度, 印度尼西亚。

(183) 花丽斑尺蛾 *Berta digitijuxta* Holloway, 1996 (图 235, 图 558, 图版 XV: 28)

*Berta digitijuxta* Holloway, 1996, *Malay. Nat. J.*, **49** (3—4): 288, pl. 11, [fig. 31]; figs 391, 393, Holotype♂, Java occident [west]: Mons Tjikorai. (BMNH)

♂触角基部超过 1/2 双栉形, 最长栉齿约为触角干直径的 5 倍, 尖端线形; ♀线形。额褐色, 不凸出。下唇须纤细, ♂约 1/3、♀约 2/3 伸出额外, ♀第 3 节延长。头顶前半部白色, 后半部黄绿色。胸腹部背面黄绿色, 腹部背面有白斑。♂后足胫节膨大, 有毛束和短端突, 2 对距。♂第 3 腹节腹板中部具刚毛斑。♂第 8 腹节腹板弱骨化, 中间凹陷, 两侧为钝形突。

前翅长: ♂12—14 mm; ♀13—14 mm。前翅顶角钝圆, 外缘细圆锯齿形; 后翅外缘在 M 脉间有缺刻, 并在 M<sub>3</sub> 上形成大尖齿。翅面橄榄绿色散布大小不等的白斑; 后翅外线内侧的白色带在 M<sub>3</sub> 和 CuA<sub>1</sub> 处断离; 后翅外线在 Rs 至 M<sub>3</sub> 处深锯齿形, 其下为较大的白斑; 亚缘线为 1 列月牙形白斑; 前翅缘毛灰褐色, 在翅脉端白色; 后翅缘毛白色掺杂少量灰褐色。

♂外生殖器: 钩形突强骨化, 端部细长且尖。背兜侧突膜质, 短于钩形突。颞形突中突圆, 骨化。抱器瓣膜质, 端部钝圆; 抱器背基半部较直, 端部内凹; 抱器腹缘中部凹; 抱器为 1 短小钝形骨化突, 边缘有小齿; 抱器腹弱骨化。阳端基环具 1 大粗壮骨化突, 端部尖。囊形突凸出。未见味刷。阳茎端部粗壮, 骨化, 边缘有 1 列小齿; 阳茎盲囊细长。

♀外生殖器: 未知。

**寄主:** 壳斗科 Fagaceae: 锥属 *Castanopsis*。

**检视标本:** IZCAS: 1♂, 四川峨眉山清音阁, 1957. VI. 29, 卢佑才采; 1♂, 同前, 1957. IX. 19, 朱复兴采。

BMNH: 1♂, holotype, Java occident, Mons Tjikorai, 4000 ft, 1892, H. Fruhstorfer (BMNH slide NO. 17285); 1♂ 3♀♀, paratypes, Nongkodjadjar, E. Java, 4000 ft, January, 1934, (A. M. R. Wegner), Rothschild Bequest, B. M. 1939-1; 1♀, paratype, *ibidem*, December, 1933.

**分布:** 四川; 马来西亚, 印度尼西亚 (爪哇岛、巴厘岛)。

(184) 圆丽斑尺蛾 *Berta poppaea* Prout, 1917 (图 236, 图 914, 图版 XV: 29)

*Berta poppaea* Prout, 1917b, *Novit. zool.*, **24**: 302. Holotype♂, [China]: Hainan, Mt Wu-