

(6) 双弓尺蛾 *Calleremites subornata* Warren, 1894 (图 73, 图 397, 图版I: 9, 10)

Calleremites subornata Warren, 1894a, *Novit. zool.*, 1: 385. Holotype ♂, [India]: Sikkim. (BMNH)

♂触角线形。额黄褐色。下唇须 1/4 伸出额外，腹面和侧面大部分灰白，背面灰黑色。头顶白色。前胸背面灰黄绿色，肩片白色；胸部腹面黄色。腹部背面灰绿色，第 1 腹节颜色较深；无立毛簇。标本后足缺失。♂第 8 腹节腹板骨化，上缘平，向两侧凸出，两侧具指状突。

前翅长：♂29 mm。翅面灰绿色。前翅基部灰色；内线灰褐色，弧形弯曲，在前缘处加粗；外线灰褐色，向内斜行，达 CuA₂ 后又外折；内外线之间暗橄榄色；外线外侧灰色，下半部有白色短条斑，翅端部颜色较深；顶角附近淡黄褐色，臀角处灰黄绿色。后翅外线在 M₁ 上方外倾，M₁ 下方内弯至 CuA₁ 后又外倾，在 M₁ 上形成圆滑突，其外侧下半部亦有白色短条斑，外线内侧灰绿色，外侧至翅端部颜色逐渐加深；缘线黄绿色。前后翅缘毛灰色。翅反面：污黄色，翅基部鲜黄色；前翅中室下方至后缘有灰色区域；前后翅均有黑色大中点，中点内有浅色线；具宽阔端带，颜色不均匀，前翅端带在前缘处颜色尤浅，均不达外缘。

♂外生殖器：钩形突细长，端部圆。背兜侧突弱骨化，接近膜质，短粗头状。颚形突中突细长，指状。抱器瓣小，中等宽；抱器背略隆起；抱器腹短小，其长度小于抱器背长度的 1/2；抱器瓣上具刺的骨化纵脊由抱器腹端部伸达抱器瓣外 1/3 处。囊形突出，宽大舌状。阳茎短粗，强骨化，阳茎鞘近端部处有 1 细长指状骨化突和另外 2 个短突。

♀外生殖器：未知。

检视标本：IZCAS: 1♂, 云南沧源, 675 m, 1980. VI. 10.

BMNH: 1♂, holotype, Sikkim, Felder Colln, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1 (BMNH slide NO. 17168).

分布：云南；印度（锡金）。

备考：本种迄今为止仅记载上述 2 个♂标本，是极为珍稀的种类。1995 年英国 J. Holloway 博士访问中国科学院动物研究所时见到并协助鉴定中国云南沧源的标本时即指出这一点。

6. 峰尺蛾属 *Dindica* Moore, 1888

Dindica Moore, 1888, in Hewitson & Moore, *Descr. new Indian lepid. Insects Colln late Mr W. S. Atkinson*, (3): 248. Type species: *Hypochroma basiflavata* Moore, 1868 (= *Hypochroma*