

Nemoria viridata: Staudinger, 1901, in Staudinger & Rebel, *Cat. Lepid. palaeart. Faunengeb.*, 1: 263.

Chlorissa viridata: Prout, 1912, in Wytsman, *Genera Insectorum*, 129: 173.

分布: 新疆; 俄罗斯, 小亚细亚; 中亚, 欧洲。

本种已记载 3 个亚种, 中国分布指名亚种。

绿仿锈腰尺蛾指名亚种 *Chlorissa viridata viridata* (Linnaeus, 1758) (图 246, 图 568, 图版 XV: 39)

此种外型与遗仿锈腰尺蛾 *Ch. obliterata* 很相似, 差别主要在于: 额、下唇须及胸部腹面为棕褐色, 而遗仿锈腰尺蛾为红褐色。前翅长: 12 mm。

♂ 外生殖器: 抱器背三角形凸起端部的刺状延伸较短; 囊形突较长。

♀ 外生殖器: 未知。

寄主: 桦木科 Betulaceae: 桦木属 *Betula*; 岩高兰科 Empetraceae: 东北岩高兰 *Empetrum nigrum*; 杜鹃花科 Ericaceae: 欧石南 *Calluna vulgaris*; 杨梅科 Myricaceae: *Myrica gale*; 杨柳科 Salicaceae: 匍匐柳 *Salix repens*。

检视标本: BMNH: 1♂, Uralsk, 1905, coll. M. Bartel, Rothschild Bequest B. M. 1939-1; 1♀, Zell. Coll, 1884, Geom: 1949-133; 1♂, Zell. Coll, 1884, Geom: 1949-132.

分布: 新疆; 小亚细亚; 欧洲。

备考: 新疆的分布记录来源于 Staudinger (1901) 的记录, 但我们未见到标本。

40. 亚四目绿尺蛾属 *Comostola* Meyrick, 1888

Comostola Meyrick, 1888, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, 2 (2): 836, 869. **Type species**: *Eucrostis perlepidaria* Walker, 1866 (= *Iodis laesaria* Walker, 1861), by monotypy. [AUSTRALIA]: [Queensland], Moreton Bay; [West Australia], Swan River.

Pyrrhorachis Warren, 1896b, *Novit. zool.*, 3: 292. **Type species**: *Pyrrhorachis cornuta* Warren, 1896 (= *Eucrostis pyrrhogona* Walker, 1866), by original designation. [NEW GUINEA]: [Papua New Guinea, D'Entrecasteaux IS.], Fergusson Island.

Leucodesmia Warren, 1899, *Novit. zool.*, 6: 25. **Type species**: *Comibaena dispansa* Walker, 1861, by original designation. CEYLON. [Junior homonym of *Leucodesmia* Howard, 1895 (Hymenoptera).]

Chloeres Turner, 1910, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, 35: 561 (key), 570. **Type species**: *Chlorochroma citrolimbaria* Guenée, 1858, by original designation. AUSTRALIA.

头胸腹部: ♂ 触角双栉形, 向尖端栉齿渐短; ♀ 线形、纤毛状或锯齿形。额不凸出。下唇须细弱。胸腹部背面无立毛簇。♂ 后足胫节通常不膨大, 少数种类膨大且具毛