

- 前翅臀角有斑块，外线在后缘达臀角斑 23
23. 前翅外线外侧在 M_2-M_3 间有白色区域 云纹绿尺蛾 *C. pictipennis*
- 前翅外线外侧在 M_2-M_3 间无白色区域 24
24. 前翅臀角及后翅顶角斑颜色均匀 栎绿尺蛾 *C. quadrinotata*
- 前翅臀角及后翅顶角斑中间色浅，周围色深 25
25. 后翅顶角斑较大，下缘达 M_2 ，内缘圆滑， R_s 及 M_1 在斑中为褐色 亚肾纹绿尺蛾 *C. subprocumbaria*
- 后翅顶角斑较小，下缘达 M_1 ，内缘凸出，仅 R_s 在斑中为褐色 肾纹绿尺蛾 *C. procumbaria*

(130) 顶绿尺蛾 *Comibaena apicipicta* Prout, 1912 (图 184, 图 508, 图版Ⅻ: 12)

Comibaena apicipicta Prout, 1912, in Wytsman *Genera Insectorum*, **129**: 101. Holotype♂, [China]: Tibet, Yatung. (BMNH)

♂触角双栉形，最长栉齿约为触角干直径的 8 倍，尖端近 1/3 线形；♀未知（检视标本触角缺失）。额褐色，不凸出。下唇须褐色，约 1/3 伸出额外。头顶及胸部背面同翅色。♂后足胫节不膨大，无毛束和端突，具 2 对距。♂第 8 腹节背板凸出；腹板中部具 1 纵向的小骨化脊。

前翅长：♂13 mm。翅面绿色，散布银色短横线。前翅顶角尖；前缘黄白色；无内线和外线；有黑色小中点；臀角处无斑；缘线暗红色。后翅外缘圆，中点较前翅略大，在顶角处 $Sc+R_1$ 与 M_1 脉间有 1 粉色斑，粉色斑边缘的缘线黑色粗壮；缘线在顶角处和 M_1 下方另有 2 个黑点。翅反面几乎白色，有褐色小中点。

♂外生殖器：钩形突细长、二分裂状，上下粗细均匀。背兜侧突长于钩形突，基部较粗，尖端尖细、钩状外弯。颚形突不发达。抱器瓣弱骨化，端部钝圆；抱器背发达，中部外凸，端部骨化，较尖，具小齿，其腹缘中部具 1 小尖齿，其上具微齿。囊形突二分叉，两分叉细长，端部略细。阳茎细长、骨化，密布小齿；阳茎盲囊端部不膨大。

♀外生殖器：未知。

检视标本：IZCAS: 1♂，福建武夷山，1982. IX. 22，张宝林采；5♂♂，云南丽江玉龙山，1962. VII. 22—23，宋士美采；1♂，同前，3200 m，1984. VII. 15，刘大军采；1♀，西藏吉隆，托当，3300 m，1975. VIII. 3，王子清采。

BMNH: 1♂，holotype, Yatung, Tibet, A. E. Hobson, 98-201 (a label's under-side with Prout's identified label and with 'type' on it); 2♂♂, same data. (another male specimens's locality is not clear, maybe: Chumei, Val, 1928. VI. 12).

分布：福建、云南、西藏。