

色，淋绿尺蛾无缘线，缘毛在脉端为褐色；弱绿尺蛾和新绿尺蛾后翅正面有白色亚缘线。

(141) 宽线绿尺蛾 *Comibaena latilinea* Prout, 1912 (图 195, 图版IV: 23)

*Comibaena latilinea* Prout, 1912, in Wytsman, *Genera Insectorum*, **129**: 101. Holotype♂, China (west): Pu-tsu-Fong. (BMNH)

♂触角特征未知（检视标本触角缺失）。额浅绿色。下唇须褐色，约 1/3 伸出额外。胸部背面淡绿色。后足特征及腹部颜色未知。♂第 3 腹节腹板具 1 对微弱刚毛斑。♂第 8 腹节腹板膜质，中间凹陷。

前翅长：♂13 mm。前翅顶角较钝，外缘浅锯齿形，后缘较圆；内线白色粗壮、直行、略外倾，始于前缘内 1/3 处，达后缘的 1/3—1/2 区域；外线从前缘外 1/3 处至近臀角，亦直行，与内线粗细几乎相同；中点小，黄褐色；缘线褐色，缘毛白色，在翅脉端为褐色。后翅外缘圆，略波曲；翅面除黄褐色小中点外无其他斑纹；缘线、缘毛同前翅。翅反面较正面色浅，只可见前后翅上的黄褐色小中点。

♂外生殖器：钩形突二分叉状，向端部渐细。背兜侧突尖端钝，长于钩形突。颚形突侧臂骨化，在中间不相接。抱器瓣短小，膜质，端部钝圆，抱器背近端部处有 1 小片状突。囊形突端部下缘深凹陷，2 侧突比弱绿尺蛾和新绿尺蛾短。无味刷。阳茎细长；阳茎盲囊渐细，端部几乎不膨大。

♀外生殖器：未知。

检视标本：BMNH: 1♂, holotype, Pu-tsu-Fang, 9820 ft, Native coll. June & July, 1890, Leech Coll. 1900-64.

分布：四川。

(142) 紫斑绿尺蛾 *Comibaena nigromacularia* (Leech, 1897) (图 196, 图 520, 图 797, 图版IV: 24)

*Euchloris nigromacularia* Leech, 1897, *Ann. Mag. nat. Hist.*, (6) **20**: 237. Syntypes 2♀♀, China (west): Chow-pin-sa; Japan: Yokohama. (BMNH)

*Uliocnemis delicatior* Warren, 1897c, *Novit. zool.*, **4**: 391. Holotype ♀, Japan. (BMNH)

#### Syn. nov.

*Comibaena nigromacularia*: Prout, 1912, in Wytsman, *Genera Insectorum*, **129**: 100.

*Phorodesma eurynomaria* Oberthür, 1916, *Études Lépid. comp.*, **12**: 106, pl. 388, fig. 3274. Syntype(s), [China]: Tse-kou. (ZFMK)

*Comibaena nigromacularia delicatior*: Inoue, 1961, *Insecta Japonica*, (1) **4**: 73, pl. 6: 138.

♂触角双栉形，末端约 1/3 无栉齿；♀线形带纤毛。额绿色。下唇须中等长，鳞毛