

分布：浙江、福建、广西、四川、云南。

备考：指名亚种除了外线不如中国亚种 *C. signifera subargentaria* 曲折外，无其他区别。

(148) 洁绿尺蛾 *Comibaena striataria* (Leech, 1897) (图 202, 图 526, 图版 XIV: 30)

*Euchloris striataria* Leech, 1897, *Ann. Mag. nat. Hist.*, (6) 20: 239. Holotype ♀, China (western): Che-tou. (BMNH)

*Comibaena striataria*: Prout, 1912, in Seitz, *Macrolepid. World*, 4: 20, pl. 2c.

♂触角双栉形，栉齿极长，端部约 1/4 线形；♀触角线形带纤毛。额不凸出，浅绿色。头顶浅绿色。♂第 8 腹节腹板中部具 1 小骨化尖齿。

前翅长：♂♀ 13.5 mm。翅面绿色，有白色短线；前翅前缘白色；几乎无其他斑纹；缘毛浅绿色。翅反面前缘基半部灰黑色，前翅有极微弱的褐色小中点。

♂外生殖器：钩形突二分叉状，长于背兜侧突。背兜侧突弯曲，端部尖，钩状。抱器瓣狭长，端部弯曲；抱器背骨化，膨大凸出，端部钝，具小齿，腹缘中部有 1 大尖齿，基部具另 1 细长骨化突。囊形突宽阔，中间凹陷较浅，2 叉钝。阳茎细长；阳茎盲囊端部略呈钩状。

♀外生殖器：未知。

检视标本：IZCAS: 1♂，云南丽江玉龙山，1962. VII. 23，宋士美采；3♂♂，同前，2800 m，1984. VII. 15—17，刘大军采。

BMNH: 1♀，holotype, Che-tou, 11 070 ft, Native coll, 1890. July & August.

ZFMK: 35 ♂♂, Likiang (China), Provinz Nord-Yuennan, 28. 3—27. 7. 1935, H. Höne; 1♂, Nord-Yuennan, A tun tse, 3500 m, 1936. IX. 3, H. Höne; 1♂, *ibidem*, 4500 m, 1936. VIII. 20, H. Höne; 1♂, Shaanxi, Tapaishan, 1935. III. 17, H. Höne.

分布：陕西、四川、云南。

(149) 黑角绿尺蛾 *Comibaena subdelicata* Inoue, 1986 (图 203, 图 527, 图版 XIV: 31)

*Comibaena subdelicata* Inoue, 1986a, *Tinea*, 12 (7): 52, figs 6c, d, 7c, d. Holotype ♂, Japan: Yakushima, Nagata. (BMNH)

♂触角双栉形，外侧栉齿长于内侧，最长栉齿约为触角干直径的 6 倍，尖端约 1/4 线形带纤毛；♀线形。下唇须白色略带褐色或浅绿色，♂1/3、♀2/3 伸出额外。头顶浅绿色。胸部背面绿色。♂后足胫节膨大，有毛束和 2 对距，端突长于第 1 跗节。♂第 3 腹节腹板靠近下部具 1 对刚毛斑。♂第 8 腹节背板边缘骨化、波曲；腹板中部凸出，骨化。边缘较平。