

长，端部稍膨大；抱器背较宽大，背缘膨大，腹缘中部有 1 大尖齿，尖齿和端部之间骨化强，边缘有微齿，抱器背端部亦有 1 骨化片。囊形突 2 突较短，稍尖，中间平直，很宽。阳茎细长；阳茎盲囊细，端部略呈钩状。

♀外生殖器：表皮突细长。交配孔周围褶皱，后阴片骨化。囊导管极细，上半段弱骨化。囊体弱。

**检视标本：**IZCAS: 1♂，黑龙江带岭，1959. VII. 6；1♂1♀，吉林长白山，1982. VII. 2—9，张宝林采；1♀，内蒙古大杨树，1985. VII. 7，薛大勇采；1♂，河南嵩县白云山，1300 m，2001. VI. 27，申效诚采；1♀，同前，1400 m，2003. VII. 21。

BMNH: 1♂，Sutschanski-Rudnik, Ussuri, L. B. Prout Coll. B. M. 1939-643. (no identical label); 1♂，Anutshino, So. Ussuri, June 1908, 100 km from Nikolsk; 1♀，Russ. O. Asien, Ussuri, coll. Dr. Moltrecht, 61. 29, Joicey Bequest, Brit. Mus. 1934-120; 1♂，Mandschourie, Sidemi, Dr. A. Moltrecht, 1907, Ex. Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3; 2♀♀，Narva, S. Ussurigebiet, 29. 7. 1921, N. Kardakoff, 61. 29, Joicey Bequest, Brit. Mus. 1934-120.

ZFMK: 1♂，Sutschanski Rudnik, Wladiwostock occ. Juli, Ussuri; 1♂，Swishin-Olto, Nord-Korea, A. Kricheldorff; 1♂，Mandschuria Maoreschan (= Mauschen), Juli.

**分布：**黑龙江、吉林、内蒙古东部、河南；朝鲜半岛，俄罗斯（阿穆尔地区，乌苏里地区）。

(155) 平纹绿尺蛾 *Comibaena tenuisaria* (Graeser, 1889) (图 209, 图 533, 图版 XIV: 37)

*Phorodesma tenuisaria* Graeser, 1889, *Berl. ent. Z.*, **32**: 385. Holotype♂, [Russia]: Amurlandes, Vladivostok.

*Euchloris tenuisaria*: Staudinger, 1901, in Staudinger & Rebel, *Cat. Lepid. Palaearct. Faunengeb.*, **1**: 262.

*Comibaena tenuisaria*: Prout, 1912, in Wytsman, *Genera Insectorum*, **129**: 99.

♂触角双栉形，外侧栉齿长于内侧，最长栉齿约为触角干直径的 6 倍，尖端纤毛状。额不凸出，绿色。下唇须褐色，♂约 1/3、♀ 1/2—2/3 伸出额外。头顶浅绿色。胸部背面浅绿色；腹部背面浅褐色。♂后足胫节膨大，有毛束，2 对距，端突长度约和第 1 跗节相等。♂第 3 腹节腹板具 1 对弱刚毛斑。♂第 8 腹节背板端部浅凹陷；腹板膜质，凸出，边缘平。

前翅长：♂14—16 mm；♀17 mm。翅绿色；前后翅外缘微波曲，或呈浅锯齿形；前后翅均有褐色小中点。前翅前缘浅绿色，其下方具 1 狭窄白带；内线白色纤细，弧形弯曲；外线白色，细弱，始于前缘外 1/3 处，外倾至 M<sub>1</sub> 附近形成 1 钝突后直行至

CuA<sub>2</sub> 脉, 后外倾, 在臀褶处形成 1 钝突后外倾达后缘; 在臀角处具 1 大斑, 周围棕褐色, 内部白色, 臀褶上略带褐色; 缘线棕褐色; 缘毛棕褐色与白色相杂, 脉端为棕褐色。后翅顶角褐斑“8”字形, 内缘波曲, 止于 M<sub>1</sub>, 内部白色; 臀角白斑小, 略带褐色; 亚缘线沿顶角褐斑内缘下行至 M<sub>1</sub> 后与褐色缘线接触, 在臀褶处内弯形成臀角斑的内缘; 缘线缘毛同前翅。翅反面: 两翅均有褐色小中点; 前翅大部淡绿色, 其后缘区域和后翅近白色; 两翅均有较宽阔的暗绿色外线, 在前翅不清晰。

♂ 外生殖器: 钩形突二分裂状, 细长, 端部尖。背兜侧突基部较粗, 端部较细, 末端尖。颚形突不发达。抱器瓣膜质、宽窄均匀, 端部钝圆, 略向上翘。囊形突发达, 长宽相等, 端部深凹陷, 2 侧突尖。阳茎纤细; 阳茎盲囊较阳茎体细, 端部不膨大。

♀ 外生殖器: 未知。

检视标本: IZCAS: 1♀, 河南南阳宝天曼, 2006. VI. 4, 申效诚、孙浩、赵华东采; 1♀, 河南嵩县白云山, 1400 m, 2003. VII. 27, 张丹丹采; 1♂, 同前, 1300 m, 2001. VI. 24, 申效诚采; 1♀, 山西和顺, 1986. VII. 14; 1♀, 陕西黄柏原, 1980. VII. 18; 1♀, 甘肃天水龙门; 1♀, 甘肃天水利桥, 1450 m, 1992. VII. 2; 1♀, 甘肃成县飞龙峡, 1020 m, 1999. VII. 4, 姚建采; 1♀, 甘肃永登连城, 1992. V. 15, 薛大勇采; 1♀, 甘肃康县清河林场, 1400 m, 1999. VII. 8, 姚建采; 1♀, 福建三港, 1981. VI. 10, 汪家社、江夷采; 1♀, 同前, 1981. VI. 14, 齐石成采。

BMNH: 1♂, Sutschanski Rudnik, Wladiwostock occ, Ussuri, August, L. B. Prout Coll., B. M. 1939-643; 1♂, Russ. Inseln, S. Ussurigebiet, 19. 7. 1920, N. Kardakoff, 61. 29, Joicey Bequest, Brit. Mus. 1934-120; 1♂, *ibidem*, 23. 8. 1920; 1♂, Weadio, Coll. Christoph, Ex. Coll. H. J. Elwes, 1920, Joicey Bequest, Brit. Mus. 1934-120.

ZFMK: 1♂, Lungtan bei Nanking, Prov. Kiangsu, China, 3. 6. 1933, H. Höne; 1♀, Mien-shan (Prov. Shansi), Obere Höhe ca. 2000 m, 6. 7. 1937, H. Höne; 1♂, Sutschanski Rudnik, Wladiwostock occ. Juli, Ussuri; 1♂, Seishin-Olto, Nord-Korea, A. Krichedorff.

分布: 山西、河南、陕西、甘肃、江苏、安徽、福建; 朝鲜半岛, 俄罗斯(阿穆尔地区, 乌苏里地区)。

### 31. 银绿尺蛾属 *Argyrocosma* Turner, 1910

*Argyrocosma* Turner, 1910, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, **35**: 562 (key), 609. **Type species:** *Euchloris argosticta* Turner, 1904, by original designation. AUSTRALIA: Queensland, Townsville.