

(198) 康亚四目绿尺蛾 *Comostola cognata* Yazaki et Wang, 2003 (图版 XV: 42)

Comostola cognata Yazaki et Wang, 2003, *Tinea*, **17** (4): 200, figs. 3, 19, 20. China: Guangdong (SCAU)

前翅长: 12 mm。与点线亚四目绿尺蛾 *C. maculata* 和点亚四目绿尺蛾 *C. ocellulata* 很相近, 不同之处在于: 翅面无蓝色调; 两翅中点、缘线为黑色; 前翅外线在 M_2 与 M_3 上的小点与中室端脉的距离明显小于与外缘的距离。♂第8腹节腹板骨化, 半圆形凹陷, 底部具2个小齿。

♂外生殖器: 钩形突端部浅二分裂状。背兜侧突膜质。颚形突中突细长且尖。抱器瓣向端部渐窄, 腹缘弧形弯曲; 抱器背基部具1大突, 端部膨大; 抱器腹骨化, 左右不对称: 左侧端部1/3具小齿; 右侧近端部具1钝骨化突, 无齿。阳茎短; 阳茎端膜上具1大2小3丛刺状角状器。

♀外生殖器: 后阴片为1对发达骨片, 端部边缘锯齿形。囊导管极短, 囊颈骨化、褶皱。囊体内有1囊片。

检视标本: SCAU: 1♂, holotype, S. China, Guangdong, Shaoguan, Nanling National Nature Reserve, 1100 m, 20—24. II. 2003.

分布: 广东。

(199) 鲜亚四目绿尺蛾 *Comostola dyakaria* (Walker, 1861) (图 249, 图 571, 图 827, 图版 XV: 43)

Eucrostis dyakaria Walker, 1861, *List Specimens lepid. Insects Colln Br. Mus.*, **22**: 567. Syntype(s) ♂, [Borneo]: Sarawak. (OUM)

Comostola albi fimbria Warren, 1896a, *Novit. zool.*, **3**: 105. Holotype ♂, [India]: Khasi Hills. (BMNH)

Comostola dyakaria: Swinhoe, 1900, *Lep. Het. Oxford Mus.*, **2**: 396.

Chloeres dyakaria: Prout, 1912, in Wytsman, *Genera Insectorum*, **129**: 240.

♂触角基部超过1/2双栉形, 最长栉齿为触角干直径的2—3倍; ♀线形。额不凸出, 下缘白色杂绿色, 上缘红褐色。下唇须腹面白色, 背面和侧面红褐色, ♂约1/2、♀超出1/2伸出额外。头顶前缘白色, 其余部分及胸腹部背面绿色。♂后足胫节膨大, 有毛束, 胫节端无端突, 但极膨大, 胫距2对。♂第3腹节腹板中部具刚毛斑, 第8腹节腹板中部具小凹陷, 微弱骨化。

前翅长: ♂8 mm; ♀9 mm。翅绿色。前翅顶角钝圆, 外缘倾斜, 较直; 后翅外缘中部略呈折角状凸出。前翅前缘灰红色; 隐约可见淡绿色的波曲内线和锯齿形外线。后翅隐约可见淡绿色锯齿形外线。前后翅均有黑色中点, 外围有浅色边; 缘线内侧红褐