

弱骨化。抱器瓣膜质，端部狭窄，圆；抱器背基半部凸出，中部以外弯曲；抱器为抱器瓣中部的骨化带，上具细密骨化刺；抱器腹骨化，较短，基半部膨大，无突。囊形突半圆形。阳茎具1骨化带，无角状器。

♀外生殖器（据 Inoue, 1986）：后阴片为薄而大的圆形片，比点亚四目绿尺蛾 *C. ocellulata* 大；囊体内具小囊片，而点亚四目绿尺蛾无囊片。

检视标本：BMNH: 1♂, holotype, Fenchihu, iboam, Chiayi, Formosa, 1600 m, 10. IV. 1965, T. Shirozu, Inoue Coll. B. M. 1992-71 (BMNH slide NO. 16488; Type status verified, K. Buckmaster 1993; Type photographed in colour)

分布：中国台湾。

(201) 蓝亚四目绿尺蛾 *Comostola francki* Prout, 1934 (图版 XV: 45)

Comostola francki Prout, 1934, in Seitz, *Macrolepid. World*, **12**: 130; *ibidem*, 4, (Suppl.): pl. 3f. Holotype♂, China (west): Kwanhsien. (BMNH)

♂触角超过1/2双栉形，栉齿长度约为触角干直径的3倍，尖端锯齿形。额下半部白色，上半部红褐色。下唇须腹面白色，背面灰褐色，♂约1/2伸出额外。头顶及胸腹部背面绿色。后足胫节2对距。

前翅长：♂10 mm。翅面蓝绿色。前翅顶角略尖，外缘微呈浅弧形；后翅外缘在 M_3 脉端略凸，折角状。前翅前缘淡黄褐色；内线只可见中室下缘和2A脉上的2个小淡黄色点，点内侧略带红褐色；中点中心黄白色，中圈褐色，外圈淡黄色或黄白色；外线亦为脉上小淡黄点，在 M_3 至 CuA_2 脉间外凸，小点外侧有红褐色；缘线褐色，在脉端略有间断；缘毛黄白色。后翅中点较前翅大；外线在 M_2 至 CuA_2 间弯曲，弯曲处离中点较远；缘线、缘毛同前翅。翅反面淡绿白色，前翅前缘基部黄褐色。前后翅中点圆。

♂♀外生殖器：未知。

检视标本：BMNH: 1♂, holotype, kwanhsien, 16. VII. 1930, M. Franck, L. B. Prout Coll. B. M. 1939-643 (*Comostola francki* Prout type♂; red type label); 2♂♂, paratypes, *ibidem*, 19 & 28. VII. 1930.

分布：四川。

(202) 红斑亚四目绿尺蛾 *Comostola laesaria* (Walker, 1861) (图 251, 图 573, 图 828, 图版 XV: 46)

Jodis laesaria Walker, 1861, *List Specimens lepid. Insects Colln Br. Mus.*, **22**: 544. Holotype ♀, Ceylon [Sri Lanka]. (BMNH)

Eucrostis perlepidaria Walker, 1866, *List Specimens lepid. Insects Colln Br. Mus.*, **35**: