

种检索表

1. ♂触角几乎全部双栉形，仅尖端无栉齿 2
 ♂触角具双栉形栉齿的长度不超过触角长度的 2/3 3
2. 前翅外线清晰，后翅基部灰色，有粗壮外线；翅反面带猩红或粉红色调；♂颚形突两侧无骨化突 克峰尺蛾 *D. kishidai*
 前翅外线不清晰，后翅基部白色，无外线，只可见翅反面外线痕迹；翅反面无猩红或粉红色；♂颚形突两侧有 1 对多刺的骨化突 灰峰尺蛾 *D. glaucescens*
3. 翅面及正反两面的端带均带紫红色；♂背兜侧突近基部处具 1 对发达骨化突 紫峰尺蛾 *D. purpurata*
 翅面及端带不带紫红色；♂背兜侧突近基部处无上述发达骨化突 4
4. 后翅不为黄色，后翅反面有中点 5
 后翅或多或少总有黄色，后翅反面中点有或无 8
5. 翅反面无外线，有端带 6
 翅反面有外线，端带有或无 7
6. 前翅外线中部凸出尖锐；♂抱器背基部有细长弯曲骨化突 亚绿峰尺蛾 *D. subvirens*
 前翅外线中部凸出钝圆；♂抱器背基部无骨化突 绿峰尺蛾 *D. virescens*
7. 前翅外线折角处较钝；后翅正面和 2 翅反面均无端带；♂背兜侧突和颚形突侧臂凸出 平峰尺蛾 *D. limatula*
 前翅外线折角处较尖；后翅正面和 2 翅反面具清晰黑褐色端带；♂背兜侧突和颚形突不如上述 天目峰尺蛾 *D. tienmuensis*
8. 后翅反面无中点；♂背兜侧突端部长于 1/2 二分叉 9
 后翅反面有中点，或有弱中点，或无；♂背兜侧突端部短于 1/2 二分叉 10
9. 前翅浅橄榄绿色；后翅反面端带在 CuA₁ 以下不达外缘；♂颚形突中部多刚毛的区域几乎直 橄榄峰尺蛾 *D. olivacea*
 前翅灰绿色杂深褐色；后翅反面端带在 CuA₁ 以下达外缘；♂颚形突中部多刚毛的区域向腹面扩展，两侧亦膨大 洪峰尺蛾 *D. hepatica*
10. 后翅正面通常鲜黄色 11
 后翅正面不为鲜黄色 12
11. 后翅端带较窄或断续，反面中点有或无；♂背兜侧面有 1 对发达角状突 茶点峰尺蛾 *D. para*
 后翅端带宽阔，反面无中点；♂背兜侧面无上述角状突 宽带峰尺蛾 *D. polyphaenaria*
12. 前翅顶角有 1 白斑或污白斑 白顶峰尺蛾 *D. wilemani*
 前翅顶角无白斑 台湾峰尺蛾 *D. taiwana*

(7) 灰峰尺蛾 *Dindica glaucescens* Inoue, 1990 (图 74, 图 398, 图版 I : 11, 12)

Dindica glaucescens Inoue, 1990a, Bull. Fac. domest. Sci., Otsuma Wom. Univ., 26: 148, figs 89,

90. Holotype♂, China: Hoeng-shan, 900 m, Provinz Hunan. (BMNH)

♂触角双栉形至尖端，尖端栉齿极短，最长栉齿约为触角干直径的5倍；♀线形。额淡灰绿色，极度凸出。下唇须灰绿色与黑色掺杂，尖端伸出额外。头顶灰绿色。胸部背面深灰绿色与黑褐色掺杂，鳞片极粗糙，发达；腹部背面未知。♂后足胫节不膨大。♂第3腹节腹板未见刚毛斑。

前翅长：♂19—20 mm；♀22 mm。前翅绿色，散布大量灰褐色和淡粉色鳞片；翅基部有小黑斑；内线、外线不清晰，在中室中上方可见黑色内线； M_1 上方白色锯齿形亚缘线清晰；缘毛灰绿色，在脉端多褐色。后翅白色，端部散布暗绿色及褐色点；缘线粗，褐色，不连续；缘毛同前翅；可见翅反面弯曲的外线。翅反面：污白略带浅粉色，散布褐点，前翅中部多褐色；前后翅均有弯曲的褐色外线；前翅外线粗壮，在 M_3 上方直行，达 M_3 后向内斜行，略有增粗，止于臀褶；中点黑褐色，弯曲。后翅反面外线细弱，在 M_3 处为1钝折角，从前缘中部略外侧至后缘中部。

♂外生殖器：背兜侧突端部超出1/2二分叉，分叉细长且尖。颚形突侧臂发达，有1对长且多毛的突；中突长，具长毛，端部圆。抱器背宽阔片状，由基部至端部宽度均匀，弧形弯曲，端部平截；抱器小瓣超出抱器背，其端部圆，具褶皱；在抱器瓣中部具1多刺的骨化斑；抱器腹外缘弯曲，其端部为丛刺状。横带片简单片状。囊形突小。未见味刷。阳茎弱骨化。

♀外生殖器：未知。

检视标本：IZCAS: 1♂, Hoeng-shan, 900 m, Provinz Hunan, China, 20. 3. 1933, H. Höne. (ex. ZFMK).

BMNH: 1♂, holotype, Hoeng-shan, 900 m, Provinz Hunan, China, 27. 3. 1933, H. Höne, Inoue Coll. B. M. 1992-71, type status verified K. Buckmaster, 1993, type photographed in color (BMNH slide NO. 16572, yellow label 13964).

ZFMK: 16♂♂ 1♀, Hoeng-shan, 900 m, Provinz Hunan, China, 17. 3—1. 4. 1933, H. Höne.

分布：湖南。

(8) 洪峰尺蛾 *Dindica hepatica* Inoue, 1990 (图 75, 图 399, 图版 I : 13, 14)

Dindica hepatica Inoue, 1990a, Bull. Fac. domest. Sci., Otsuma Wom. Univ., 26: 130, figs 29, 30. Holotype♂, Hong Kong: New Territories, Taipo Kaw. (BMNH)

♂触角基部1/2双栉形，端部线形，最长栉齿约为触角干直径的1.5倍；♀线形。额极度凸出，倾斜，灰绿色，杂极少褐色。下唇须红褐色、黑褐色与灰绿色掺杂，极粗糙，尖端伸出额外。胸部背面鳞片粗糙，多深灰褐色。后足胫节不膨大。♂第3腹节腹