

90. Holotype♂, China: Hoeng-shan, 900 m, Provinz Hunan. (BMNH)

♂触角双栉形至尖端，尖端栉齿极短，最长栉齿约为触角干直径的5倍；♀线形。额淡灰绿色，极度凸出。下唇须灰绿色与黑色掺杂，尖端伸出额外。头顶灰绿色。胸部背面深灰绿色与黑褐色掺杂，鳞片极粗糙，发达；腹部背面未知。♂后足胫节不膨大。♂第3腹节腹板未见刚毛斑。

前翅长：♂19—20 mm；♀22 mm。前翅绿色，散布大量灰褐色和淡粉色鳞片；翅基部有小黑斑；内线、外线不清晰，在中室中上方可见黑色内线； $M_1$ 上方白色锯齿形亚缘线清晰；缘毛灰绿色，在脉端多褐色。后翅白色，端部散布暗绿色及褐色点；缘线粗，褐色，不连续；缘毛同前翅；可见翅反面弯曲的外线。翅反面：污白略带浅粉色，散布褐点，前翅中部多褐色；前后翅均有弯曲的褐色外线；前翅外线粗壮，在 $M_3$ 上方直行，达 $M_3$ 后向内斜行，略有增粗，止于臀褶；中点黑褐色，弯曲。后翅反面外线细弱，在 $M_3$ 处为1钝折角，从前缘中部略外侧至后缘中部。

♂外生殖器：背兜侧突端部超出1/2二分叉，分叉细长且尖。颚形突侧臂发达，有1对长且多毛的突；中突长，具长毛，端部圆。抱器背宽阔片状，由基部至端部宽度均匀，弧形弯曲，端部平截；抱器小瓣超出抱器背，其端部圆，具褶皱；在抱器瓣中部具1多刺的骨化斑；抱器腹外缘弯曲，其端部为丛刺状。横带片简单片状。囊形突小。未见味刷。阳茎弱骨化。

♀外生殖器：未知。

检视标本：IZCAS: 1♂, Hoeng-shan, 900 m, Provinz Hunan, China, 20. 3. 1933, H. Höne. (ex. ZFMK).

BMNH: 1♂, holotype, Hoeng-shan, 900 m, Provinz Hunan, China, 27. 3. 1933, H. Höne, Inoue Coll. B. M. 1992-71, type status verified K. Buckmaster, 1993, type photographed in color (BMNH slide NO. 16572, yellow label 13964).

ZFMK: 16♂♂ 1♀, Hoeng-shan, 900 m, Provinz Hunan, China, 17. 3—1. 4. 1933, H. Höne.

分布：湖南。

(8) 洪峰尺蛾 *Dindica hepatica* Inoue, 1990 (图 75, 图 399, 图版 I : 13, 14)

*Dindica hepatica* Inoue, 1990a, Bull. Fac. domest. Sci., Otsuma Wom. Univ., 26: 130, figs 29, 30. Holotype♂, Hong Kong: New Territories, Taipo Kaw. (BMNH)

♂触角基部1/2双栉形，端部线形，最长栉齿约为触角干直径的1.5倍；♀线形。额极度凸出，倾斜，灰绿色，杂极少褐色。下唇须红褐色、黑褐色与灰绿色掺杂，极粗糙，尖端伸出额外。胸部背面鳞片粗糙，多深灰褐色。后足胫节不膨大。♂第3腹节腹

板具 1 对刚毛斑。

前翅长: ♂ 19—20 mm。前翅灰绿色杂深褐色、少量红褐色。前翅内线不清晰, 基部有红褐色斑, 沿 2A 脉亦有狭长黑色杂红褐色斑; 外线模糊, 黑褐色杂红褐色, 在中部圆滑外凸; 其外侧在前缘处有 1 大红褐色斑块; 亚缘线在前缘下方为白色锯齿形; 缘线在脉间为褐色小点, 缘毛基部污白色, 端部红褐色杂黑褐色。后翅基部黄色较浅; 披黄色长毛; 端带在  $M_3$  上方黑褐色, 在  $M_3$  下方变细, 黑褐色杂红褐色, 外侧橄榄绿色杂黑褐色和红褐色鳞片。翅反面由基部至中部黄色, 其余部分污白色; 前翅有短条状中点; 端带内缘在  $M_3$  处弯曲, 在前缘处多红褐色, 在 M 脉间达外缘。后翅端带宽阔, 内缘近直线, 略有弯曲, 达外缘, 由  $M_2$  下方至  $CuA_2$  为 1 白斑。

♂外生殖器: 背兜侧突端部长于 1/2 二分叉, 细长且尖。颚形突发达, 侧臂细弱, 近端部处膨大, 且两侧相连, 几乎无中突, 膨大处及中部相连处密布小齿。抱器背发达, 有折叠, 端部具 2 个尖齿; 抱器腹极发达, 近端部处具 1 粗 1 细 2 个长突, 内侧的 1 个较粗壮, 且端部另具 1 小齿, 外侧的 1 支细长且尖, 外缘在近端部 1/3 处凸出, 具多个尖齿; 抱器腹近端部处具 1 横向的小脊, 上有小刺; 抱器小瓣端部圆, 弱骨化。横带片发达, 下缘二分裂状, 向头向扩展。囊形突小, 中部具短钝凸起。有味刷。阳茎细长, 弱骨化。

♀外生殖器: 未知。

检视标本: BMNH: 1♂, holotype, Taipo Kaw, New Territories, Hong Kong, 21. IV. 1965, T. Shirôzu, Inoue Coll. B. M. 1992-71, type status verified, K. Buckmaster 1993, Type photographed in colour (BMNH slide NO. 16569) .

分布: 中国香港。

(9) 克峰尺蛾 *Dindica kishidai* Inoue, 1986 (图 76, 图 400, 图版 I : 15, 16)

*Dindica kishidai* Inoue, 1986b, Bull. Fac. domest. Sci., Otsuma Wom. Univ., 22: 215, fig. 6.  
Holotype♂, Taiwan: Nantou Hsien, Lushan Spa. (BMNH)

♂触角长双栉形, 最长栉齿约为触角干直径的 5 倍, 仅尖端无栉齿; ♀线形。额极凸出, 倾斜, 宽度约与复眼直径相当, 灰绿色杂黑褐色。下唇须发达, 灰绿色杂黑褐色, 鳞片粗糙, 约 1/3 伸出额外, 灰绿色上点缀黑点。头顶颜色基本同下唇须颜色, 略多污白色。胸部背面灰绿色, 鳞片粗糙、发达。腹部背面灰绿色与黑褐色掺杂, 第 3 腹节具发达立毛簇。♂后足胫节不膨大。

前翅长: ♂ ♀ 22—24 mm。前翅狭长, 外缘短, 顶角近直角; 翅面灰绿色与黑褐色相杂; 翅基部沿 2A 脉有黑斑; 内线不清晰, 黑色, 锯齿形, 在中室内和臀褶处各有 1 大尖齿; 中点为黑褐色小点; 外线锯齿形, 在 R 脉上向内有 1 小折角, 后直行向外, 至  $M_3$  脉后向内折, 直行达臀褶后又斜行向外达后缘, 由 R 脉至臀褶呈 “>” 形; 外线