

板具 1 对刚毛斑。

前翅长: ♂ 19—20 mm。前翅灰绿色杂深褐色、少量红褐色。前翅内线不清晰, 基部有红褐色斑, 沿 2A 脉亦有狭长黑色杂红褐色斑; 外线模糊, 黑褐色杂红褐色, 在中部圆滑外凸; 其外侧在前缘处有 1 大红褐色斑块; 亚缘线在前缘下方为白色锯齿形; 缘线在脉间为褐色小点, 缘毛基部污白色, 端部红褐色杂黑褐色。后翅基部黄色较浅; 披黄色长毛; 端带在 M_3 上方黑褐色, 在 M_3 下方变细, 黑褐色杂红褐色, 外侧橄榄绿色杂黑褐色和红褐色鳞片。翅反面由基部至中部黄色, 其余部分污白色; 前翅有短条状中点; 端带内缘在 M_3 处弯曲, 在前缘处多红褐色, 在 M 脉间达外缘。后翅端带宽阔, 内缘近直线, 略有弯曲, 达外缘, 由 M_2 下方至 CuA_2 为 1 白斑。

♂外生殖器: 背兜侧突端部长于 1/2 二分叉, 细长且尖。颚形突发达, 侧臂细弱, 近端部处膨大, 且两侧相连, 几乎无中突, 膨大处及中部相连处密布小齿。抱器背发达, 有折叠, 端部具 2 个尖齿; 抱器腹极发达, 近端部处具 1 粗 1 细 2 个长突, 内侧的 1 个较粗壮, 且端部另具 1 小齿, 外侧的 1 支细长且尖, 外缘在近端部 1/3 处凸出, 具多个尖齿; 抱器腹近端部处具 1 横向的小脊, 上有小刺; 抱器小瓣端部圆, 弱骨化。横带片发达, 下缘二分裂状, 向头向扩展。囊形突小, 中部具短钝凸起。有味刷。阳茎细长, 弱骨化。

♀外生殖器: 未知。

检视标本: BMNH: 1♂, holotype, Taipo Kaw, New Territories, Hong Kong, 21. IV. 1965, T. Shirôzu, Inoue Coll. B. M. 1992-71, type status verified, K. Buckmaster 1993, Type photographed in colour (BMNH slide NO. 16569) .

分布: 中国香港。

(9) 克峰尺蛾 *Dindica kishidai* Inoue, 1986 (图 76, 图 400, 图版 I : 15, 16)

Dindica kishidai Inoue, 1986b, Bull. Fac. domest. Sci., Otsuma Wom. Univ., 22: 215, fig. 6.
Holotype♂, Taiwan: Nantou Hsien, Lushan Spa. (BMNH)

♂触角长双栉形, 最长栉齿约为触角干直径的 5 倍, 仅尖端无栉齿; ♀线形。额极凸出, 倾斜, 宽度约与复眼直径相当, 灰绿色杂黑褐色。下唇须发达, 灰绿色杂黑褐色, 鳞片粗糙, 约 1/3 伸出额外, 灰绿色上点缀黑点。头顶颜色基本同下唇须颜色, 略多污白色。胸部背面灰绿色, 鳞片粗糙、发达。腹部背面灰绿色与黑褐色掺杂, 第 3 腹节具发达立毛簇。♂后足胫节不膨大。

前翅长: ♂ ♀ 22—24 mm。前翅狭长, 外缘短, 顶角近直角; 翅面灰绿色与黑褐色相杂; 翅基部沿 2A 脉有黑斑; 内线不清晰, 黑色, 锯齿形, 在中室内和臀褶处各有 1 大尖齿; 中点为黑褐色小点; 外线锯齿形, 在 R 脉上向内有 1 小折角, 后直行向外, 至 M_3 脉后向内折, 直行达臀褶后又斜行向外达后缘, 由 R 脉至臀褶呈 “>” 形; 外线

外侧在 R_5 上有 1 小白斑，大部分翅脉黑色； M_2 上方可见白色锯齿形亚缘线；缘线细弱黑褐色，有间断；缘毛灰绿色和黑褐色相杂，在翅脉端黑褐色较多。后翅前缘和后缘几乎等长，外缘短，圆锯齿形；翅基部污白色，端部略带褐色和灰绿色，有粉红色调，散布大量灰褐色碎纹；外线褐色清晰，宽阔，从前缘向外直行至 M_3 ，然后向内折，达臀褶后向外直行达后缘，在后缘上为 1 褐斑，在 M_3 上形成 1 大尖角，比前翅的折角钝；翅正面可见翅反面的外线。翅反面：前翅近后缘处和后翅基部 $2/3$ 污白色，其余部分浅粉色散布褐色碎点，带猩红色调；前翅外线为粗壮暗褐色带，在 M_2 和 M_3 间有折角，在臀褶上方和 CuA_2 间向内扩展，中点黑褐色，与外线相接；后翅外线暗褐色，在 M_2 和 M_3 间有折角，止于臀褶。

♂外生殖器：强骨化。背兜侧突基粗端细，端部 $1/2$ 二分叉。颚形突发达，其两侧臂下半段及中突具密齿。抱器背强骨化，长于抱器腹，中部外凸，端部钝圆，其下缘具刚毛；抱器腹强骨化，具粗大刺状端突，弯曲，抱器腹外缘中上部外凸，具浓密刚毛；抱器瓣中部亦具稀疏长刚毛；横带片为 1 对片状骨化突，内侧有 1 小尖；阳端基环片状，半圆形。囊形突小，近似半圆形。未见味刷。阳茎短，骨化，具 1 小骨化突。

♀外生殖器（据 Inoue, 1986b）：前阴片带状，两侧粗，中间凹陷。

检视标本：IZCAS: 1♂, paratype, Formosa, Chiayi, Fenchila, 1600 m, 1965. IV. 10, coll. T. Shirozu. (Prof. Inoue 赠送)。

BMNH: 1♂, holotype, Lushan Spa, Nan Tow, Formosa, 19—21. III. 1972, K. Nakatomi, Inoue Coll. B. M. 1992-71, Type status verified K. Buckmaster 1993, Type Photographed in color; 1♂, C. Formosa, 1959, Brit. Mus. 1964-737 (BMNH slide NO. 19562).

ZFMK: 1♂, paratype, [TAIWAN] Wulai (at light) Tapei Hsien, 31. III. 1984, N. Kōda et al., Museum A. Koenig Eing. Nr. 90/259.

分布：中国台湾。

(10) 平峰尺蛾 *Dindica limatula* Inoue, 1990 (图版 I : 17, 18)

Dindica limatula Inoue, 1990a, Bull. Fac. domest. Sci., Otsuma Wom. Univ., 26: 152, figured. Holotype♂, China: Hoeng-shan. (ZFMK)

♂触角约 $2/3$ 双栉形，栉齿长度约为触角干直径的 3 倍，端部无栉齿；♀线形。额及下唇须灰绿色杂黑褐色，下唇须♂尖端伸出额外。头顶灰绿色。胸部背面中部灰绿色，两侧黑褐色，鳞片极粗糙，后胸有发达立毛簇。腹部背面黑褐色杂红褐色，有立毛簇，其中第 3 节立毛簇发达。后足胫节不膨大。♂第 8 腹节背板端部 $1/2$ 骨化，中部内凹。

前翅长：♂16—20 mm；♀20—21 mm。前翅浅橄榄绿色，散布极少黑褐色及红褐