

of *H. basiflavata*, India, Bengal, Russel, Moore Coll. 94-106; 2♂♂, Khasia Hills, Assam, Collectio H. J. Elwes, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1; 2♂♂, Bhutan, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1; 1♂, Sikkim, 4-7000 ft, Möller, Collectio H. J. Elwes, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1; 1♂, North Korintji Valley, S. W. Sumatra, 5000 ft, Sept.-Oct. 1921, C. F., & J. Pratt, L. B. Coll, B. M. 1939-643 (BMNH slide NO. 13272); 1♂, Mokanshan, Prov. Chekiang, 1930, H. Höne, Brit. Mus. 1959-465 (BMNH slide NO. 6828, length of forewing only 18 mm); 1♂, Genting Tea Estate, 2000 ft, W. Pahang Malaysia (11039); 1♂, Bidi, Sarawak, 1907—1908, C. J. Brooks, L. B. Prout Coll. B. M. 1909-643, Figured specimen moths of Borneo part 9 (BMNH slide NO. 11043, Seitz XII, t. 9a).

分布：浙江、湖北、江西、湖南、福建、台湾、海南、广西、四川、贵州、云南；印度，不丹，尼泊尔，喜马拉雅山东北部，越南北部，泰国，马来西亚，印度尼西亚。

(14) 紫峰尺蛾 *Dindica purpurata* Bastelberger, 1911 (图 80, 图 404, 图 719, 图版II: 7, 8)

Dindica purpurata Bastelberger, 1911a, *Int. ent. Z.*, 4 (46): 248. Lectotype ♂, Formosa [Taiwan]: [Arizan]. (SMF)

Dindica subrosea (part): Prout, 1914, *Ent. Mitt.*, 3: 239. (*nec* Warren, 1893)

♂触角 2/3 双栉形，最长栉齿长度约为触角干直径的 3 倍，尖端线形；♀线形。额粗糙，凸出，向前平伸，黑灰绿色，下缘深红褐色与黑色相杂。下唇须鳞片粗糙，背面和侧面深红褐色与黑色相杂，腹面灰红色，♂近 1/4 伸出额外，♀近 1/3 伸出额外。胸部立毛簇极发达，深灰绿色；腹部背面第 2—5 节有黑色立毛簇，其中第 4 节立毛簇最发达。胸部腹面和腿节多毛，♂后足胫节不膨大。

前翅长：♂♀ 20 mm。前翅狭长，灰绿色带紫红色调，散布黑色鳞片；内线、中点、外线黑色与暗红色掺杂；翅基黑色略带暗红色，臀褶与 2A 脉间有 1 长条形黑斑；内线上半段外倾，下半段不清晰；中点细长；外线清晰，外倾至 M_3 处内折，在 M_3 上形成 1 尖锐折角，接近外缘，在 M_3 下方近消失；外线外侧 M_2 上方至前缘有紫红色斑，外线外侧下半段亦有不规则紫红色斑；外线外侧在翅脉间有长短不等的黑色条纹，其中在 R_5 与 M_1 间的黑纹特别粗壮；缘毛黑色、暗红与白色相杂。后翅污白色，略带红色色调，隐见细弱中点；下半部密布鳞毛；翅端部紫红色点缀少量黑色；缘线为脉间黑点；缘毛紫红色杂少量黑色，后缘缘毛污白色，长且浓密。翅反面污白或污黄色，前后翅均有紫红色宽阔端带，端带内缘均在中部外凸；前翅中点大，黑色，周围紫红色；后翅中点细弱。

♂外生殖器：背兜侧突端部 1/2 二分叉，基部较粗，其基部背面有 1 对发达骨化突。颚形突心形，两侧臂宽阔，强骨化；中突尖，密布小骨化刺。抱器背强骨化，外缘

平滑，波曲，抱器背端突尖，向抱器腹方向弯折；抱器背和抱器腹间以膜质相连；抱器腹强骨化，外缘基半部光滑，端半部具骨化齿；末端形成巨大端突，有稀疏小齿；囊形突小，具指状中突。阳茎短粗，腹面具1骨化带，端部具1弯钩形骨化突。

♀外生殖器：交配孔周围骨化；后阴片褶皱骨化；囊导管短而细弱；囊体长，弱，无囊片。第7腹节腹面、背面均骨化。

检视标本：IZCAS: 1♂♂1♀，四川峨眉山清音阁，800—1000 m, 1957. IV. 17—V. 5, 朱复兴采；4♂♂，同前，1957. IV. 28—29, 黄克仁采；1♂，同前，1957. IV. 24, 王宗元采。

BMNH: 1♂, Hori, Formosa, 1934. IV. 20; 1♀, Kagi district, Central Formosa, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1.

ZFMK: 1♂, Taiwan, Hualien Hsien, Juisui, 1987. III. 30, coll. Y. Shibata.

分布：台湾、四川。

(15) 亚绿峰尺蛾 *Dindica subvirens* Yazaki et Wang, 2004 (图版II: 9, 10)

Dindica subvirens Yazaki et Wang, 2004, *Tinea*, **18** (1): 58, figs, 5, 6, 13. China: Guangdong, Nanling. (SCAU)

♂触角2/3双栉形。♂前翅长22 mm。前翅淡黄绿色，散布褐色鳞片；后缘处斑纹和近顶角处斑清晰，红褐色；翅基部沿2A脉黑色，内线黑色，倾斜不连续；外线黑色纤细，清晰完整，在M₃下方凸出一尖齿，其下反弧形内弯；缘线黑色；缘毛淡绿色，在脉端褐色。后翅基部大部分近奶白色，端部为1条红褐色端带，在M₃至臀角处多绿色；缘线、缘毛同前翅。翅反面：前翅近奶白色，在翅前1/3散布红褐色，端部具红褐色端带，在M₃以上由外线至外缘，M₃以下渐弱，不达外缘；外线黑色，粗；中点大，黑色；后翅端带几乎同正面，色略浅，有弱小中点。

♂外生殖器（据Yazaki and Wang, 2004）：背兜侧突较宽，端部1/2二分叉，其基背部有1对骨化突。颚形突中突宽阔，近半圆形，密布小刺。抱器瓣宽阔，前缘弯曲，抱器背骨化区宽阔，端部钝，有小锯齿，抱器背基部具1外弯细长骨化突。抱器腹宽阔，骨化强，中部内缘具小骨化突，端部具发达角状端突，端部外缘有小锯齿。囊形突凸出，细小。阳茎短粗，腹面具1骨化带，端部具1弯钩形骨化突。

♀外生殖器：未知。

检视标本：SCAU: 1♂, holotype, China, Guangdong Shaoguan Nanling, 1100 m, 29—31. III. 2003, M. Owada leg.

分布：广东。

(16) 台湾峰尺蛾 *Dindica taiwana* Wileman, 1914 (图81, 图405, 图版II: 11, 12)

Dindica taiwana Wileman, 1914, *Entomologist*, **47**: 292. Lectotype♂, Formosa [Taiwan]: Ari-