

平滑，波曲，抱器背端突尖，向抱器腹方向弯折；抱器背和抱器腹间以膜质相连；抱器腹强骨化，外缘基半部光滑，端半部具骨化齿；末端形成巨大端突，有稀疏小齿；囊形突小，具指状中突。阳茎短粗，腹面具1骨化带，端部具1弯钩形骨化突。

♀外生殖器：交配孔周围骨化；后阴片褶皱骨化；囊导管短而细弱；囊体长，弱，无囊片。第7腹节腹面、背面均骨化。

检视标本：IZCAS: 10♂♂1♀，四川峨眉山清音阁，800—1000 m，1957. IV. 17—V. 5，朱复兴采；4♂♂，同前，1957. IV. 28—29，黄克仁采；1♂，同前，1957. IV. 24，王宗元采。

BMNH: 1♂，Hori, Formosa, 1934. IV. 20; 1♀，Kagi district, Central Formosa, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1.

ZFMK: 1♂，Taiwan, Hualien Hsien, Juisui, 1987. III. 30, coll. Y. Shibata.

分布：台湾、四川。

(15) 亚绿峰尺蛾 *Dindica subvirens* Yazaki et Wang, 2004 (图版 II: 9, 10)

Dindica subvirens Yazaki et Wang, 2004, *Tinea*, **18** (1): 58, figs, 5, 6, 13. China: Guangdong, Nanling. (SCAU)

♂触角 2/3 双栉形。♂前翅长 22 mm。前翅淡黄绿色，散布褐色鳞片；后缘处斑纹和近顶角处斑清晰，红褐色；翅基部沿 2A 脉黑色，内线黑色，倾斜不连续；外线黑色纤细，清晰完整，在 M_3 下方凸出一尖齿，其下反弧形内弯；缘线黑色；缘毛淡绿色，在脉端褐色。后翅基部大部分近奶白色，端部为 1 条红褐色端带，在 M_3 至臀角处多绿色；缘线、缘毛同前翅。翅反面：前翅近奶白色，在翅前 1/3 散布红褐色，端部具红褐色端带，在 M_3 以上由外线至外缘， M_3 以下渐弱，不达外缘；外线黑色，粗；中点大，黑色；后翅端带几乎同正面，色略浅，有弱小中点。

♂外生殖器（据 Yazaki and Wang, 2004）：背兜侧突较宽，端部 1/2 二分叉，其基背部有 1 对骨化突。颞形突中突宽阔，近半圆形，密布小刺。抱器瓣宽阔，前缘弯曲，抱器背骨化区宽阔，端部钝，有小锯齿，抱器背基部具 1 外弯细长骨化突。抱器腹宽阔，骨化强，中部内缘具小骨化突，端部具发达角状端突，端部外缘有小锯齿。囊形突凸出，细小。阳茎短粗，腹面具 1 骨化带，端部具 1 弯钩形骨化突。

♀外生殖器：未知。

检视标本：SCAU: 1♂，holotype, China, Guangdong Shaoguan Nanling, 1100 m, 29—31. III. 2003, M. Owada leg.

分布：广东。

(16) 台湾峰尺蛾 *Dindica taiwana* Wileman, 1914 (图 81, 图 405, 图版 II: 11, 12)

Dindica taiwana Wileman, 1914, *Entomologist*, **47**: 292. Lectotype♂, Formosa [Taiwan]: Ari-