

检视标本: IZCAS: 1♀, 海南尖峰岭, 1983. IV. 14, 顾茂彬采; 1♀, 广东海南水满, 640 m, 1960. V. 26, 张学忠采。

BMNH: 2♂♂, Khasia Hills, Assam, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1; 1♂, Cherra Punji, Ex. Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3; 1♂, Khasis, May 1894, Nat. Coll., Rothschild Bequest, B. M. 1939-1; 1♂, Khasis, Nat. Coll., Rothschild Bequest, B. M. 1939-1 (BMNH slide NO. 16793); 1♀, Khasis, Oct. 1894, Nat. Coll., Rothschild Bequest, B. M. 1939-1; 1♂, Cherrapunji, Nov. 1893, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1; 1♀, Arizan, Formosa, 7300 ft, VII. 1909, A. E. Wileman; 1♂, Rantaizan, Formosa, 7500 ft, 17. II—V. 1909, A. E. Wileman.

ZFMK: 1♂, Khasis, Nat. Coll; 1♂, Khasis, April 1894, Nat. Coll.

ZSM: 2♂♂, WEST MALAYSIA, Cameron Highlands Strawberry Park, 23. VI. 1988; 1♂, SABAH (Borneo), Route Keningau-Kimanis, PK 28, 1300 m, 8. VIII. 1991, J. Haxaire; 1♂, S. VIETNAM, Bach-Ma Nat. Park, 16° 10' N—107° 54' E, 1200 m, 6. VIII. 1996, Siniaev et Afonin.

分布: 台湾、海南; 印度, 喜马拉雅山东北部, 越南, 马来西亚, 印度尼西亚。

(124) 星渌青尺蛾 *Dooabia puncticostata* Prout, 1923 (图 179, 图 503, 图 787, 图版 XIV: 4)

Dooabia puncticostata Prout, 1923, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (9) 11: 305. Holotype♂, [Peninsular Malaysia]: Selangor: Bukit Kutu. (BMNH)

Dooabia puncticostata quantula Prout, 1931, *Novit. zool.*, 37: 5.

♂♀触角线形。额凸出, 下半部灰绿色, 上半部杂白色。下唇须褐色, 第2、第3节鳞片粗糙; ♂约1/4、♀约1/2伸出额外。头顶、胸部背面及腹部背面前3节灰绿色, 其中腹部第2、第3节中部有白斑; 腹部背面其他各节带褐色。♂后足胫节膨大, 有毛束, 2对距, 有短端突。♂第3腹节腹板具1对刚毛斑。♂第8腹节骨化、特化, 背板为1方形骨化片; 腹板中间凹陷, 两侧为大骨化突, 近端部处具1密布密刺的骨化突, 中间为丘状骨化片。

前翅长: ♂17—19 mm; ♀17 mm。翅面暗黄绿色。前翅外缘钝锯齿形, 在顶角下缺刻, 在M₃脉端凸出; 前缘区域点缀黑褐色碎斑, 基部褐色较深; 内线墨绿色, 中部凸出, 不连续; 中点圆, 白色, 周围有墨绿色环; 外线锯齿形, 倾斜, 在翅脉上有间断, 在近前缘处向内弯曲, 不清晰; 臀角处具1大褐斑, 上端接近M₃, 斑内色略淡, 在CuA₁以上墨绿色, 在CuA₁和CuA₂间露出1小块暗黄绿色; 缘线在顶角下缺刻内形成1狭长墨绿色斑; 缘毛褐色, 在脉间尖端略带白色。后翅外缘在M₃脉端具1凸出; 顶角具1褐斑; 中点同前翅, 较小, 周围为黑褐色镶边; 外线锯齿形, 不清晰, 几

乎和外缘平行，在前缘处为 1 小褐斑；缘毛较前翅色浅。翅反面底色较黄，斑纹同正面。

♂外生殖器：钩形突基本不凸出，仅为浅弧形。背兜侧突向尖端渐细，尖端尖，且外弯，两背兜侧突间距离较大。颚形突中突不凸出，弱骨化，仅在中部略有加粗。抱器瓣简单，中部膨大。囊形突半圆形凸出。无味刷。阳茎端部骨化，具 1 尖齿，无角状器。

♀外生殖器：前表皮突特别细弱短小，后表皮突细长。交配孔周围骨化，有褶皱。后阴片两侧各有 1 骨化褶皱区。囊导管极细长，长度和囊体长径相当。囊体椭圆形，内有双角状囊片，骨化很弱。第 7 腹节腹板两侧各有 1 大且尖的骨化齿。

检视标本：IZCAS: 1♂，海南尖峰岭，1981. XII. 16，林尤洞采。

BMNH: 1 ♂, holotype, Bukit Kutu Selangor, April 1915, 3457 ft, Brit. Mus. 1923-173 (*Dooabia puncticostata* Prout ♂ type; red type label); 1♂, Bali, Sumatra, L. B. Prout Coll. B. M. 1939-643; 1♀, Lebong Tandai, W. Sumatra, 13. XII. 1921, C. J. Brooks Coll. No. 4484; 3♂♂, Nord Borneo, Mont Kina Balu, 5—8. 1903, John Waterstradt, Ex. Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3; 2♂♂, Djoenggo Ardjoeno, E. Java, 4500', June 1934 (J. P. A. Kalis), Rothschild Bequest, B. M. 1939-1; 1♀, Sabah, Mt. Kinabalu, Kamborangoh, 2110 m, VII—IX. 1965, Cambridge Expedition to Mt. Kinabalu 1965, H. J. Banks, H. S. Barlow, & J. D. Holloway, Brit. Mus. 1968-186 (BMNH slide NO. 8923); 1♂, Site 8, February, Camp 1, Mulu, 150 m, 385470, Mixed dipt. for. MV-mainly canopy, Sarawak: Gunong, Mulu Nat. Park, R. G. S. Exped. 1977-8, J. D. Holloway, *et al.*, B. M. 1978-206.

分布：海南；马来西亚（雪兰莪、沙巴），印度尼西亚（爪哇岛、苏门答腊岛）。

(125) 读青尺蛾 *Dooabia viridata* (Moore, 1868) (图 180, 图 504, 图 788, 图版 XIV: 5)

Emomos viridata Moore, 1868, *Proc. zool. Soc. Lond.*, **1867**: 623. Syntype(s) ♀, [India]: Bengal.

Dooabia viridata: Warren, 1894a, *Novit. zool.*, **1**: 388.

Cacamoda viridata: Swinhoe, 1894, *Trans. ent. Soc. Lond.*, **1894**: 172.

Chlorodontopera viridata: Hampson, 1895b, *Fauna Br. India* (Moths), **3**: 483.

♂♀触角线形。额凸出。下唇须褐色，♂约 1/4、♀1/2 伸出额外。额、头顶、胸腹部背面同翅色。腹部背面第 2、第 3 节有白斑。♂后足胫节膨大、有毛束，胫距 2 对，有端突。♂第 3 腹节腹板中部具 1 对刚毛斑。

前翅长：♂ 20 mm；♀ 23—26 mm。翅面草绿色，散布黄褐色鳞片，线纹黄绿色，