

具1骨化带，其外缘有1排微齿；阳茎盲囊短小。

♀外生殖器：与美彩青尺蛾 *E. aphrodite* 的形状几乎相同，但因囊体破损，没有看到发达囊片。

寄主：野牡丹科 Melastomataceae：谷木属 *Memecylon*。

检视标本：IZCAS：1♂，海南尖峰岭，1982. VIII. 10，陈芝卿采；1♂，海南天池，1980. III. 22，张宝林采；1♂，西藏波密，1982. VIII. 26，韩寅恒采。

BMNH：1♀，holotype，Ceylon；1♂，Brunei，300 m，Ulu Temburong Rain forest，20. 7. 1979，Lt. Col. M. G. Allen（BMNH slide NO. 16802）；1♂，Khasis，May 1896，Nat. Coll.，Rothschild Bequest，B. M. 1939-1；1♂，S. India，T. R. Bell. B. M. 1934-394；1♂，Gopaldhara，Darjeeling，4720 ft，（H. Stevens），Rothschild Bequest，B. M. 1939-1。

分布：海南、西藏；印度，尼泊尔，斯里兰卡，马来西亚（沙捞越），文莱。

(334) 弯彩青尺蛾 *Eucyclodes infracta* (Wileman, 1911) (图 366, 图 685, 图 880, 图版 XIX：15)

Thalassodes infracta Wileman, 1911b, *Trans. ent. Soc. Lond.*, **1911**: 342, pl. 30, fig. 16, Holotype♂, Japan: Suma, near Kobe. (BMNH)

Chloromachia infracta: Prout, 1912, in Wystman, *Genera Insectorum*, **129**: 251.

Eucyclodes infracta: Holloway, 1996, *Malay. Nat. J.*, **49** (3—4): 23, 235.

♂触角纤毛状；♀线形。额大部分绿色，下1/3白色，绿色在中间向下扩展。下唇须第2节腹面带绿色，侧面白色，第3节短，褐色；约1/3伸出额外。头顶绿色杂白色。胸部背面绿色。♂后足胫节膨大，具毛束和端突，端突长于第1跗节的1/2，2对距。腹部背面红褐色杂棕褐色，背中线有白斑。♂第3腹节腹板有稀疏刚毛斑。♂第8腹节腹板有2个很小的凸起，基本不骨化。

前翅长：♂12—14 mm；♀15 mm。翅面暗绿色，中点小，较翅色略深。前翅前缘黄褐色杂黑褐色斑；内线白色，波状；外线白色，弯曲，近前缘处不清晰，其外侧在后缘上至臀角为白色杂红褐色斑；亚缘线由白色小点组成；外缘在M₃脉上有1白斑，向内扩展至亚缘线以内。后翅外线白色，在M₃—CuA₂间极为凸出；外线外侧为白色杂棕褐色斑块，在M₁下方至臀角有翅面颜色。前后翅缘线棕褐色，在翅脉上有间断，缘毛褐色。翅反面：白色带淡绿色，前翅上半部绿色较深；前翅具褐色中点；后翅顶角具褐斑。

♂外生殖器：钩形突端部膨大，中间凹陷浅。背兜侧突弱，略短于钩形突的1/3。颚形突中突尖齿形。抱器瓣基部较宽，端部渐窄，膜质；抱器背弱骨化，端突较圆，超出抱器瓣端部；抱器瓣基部具凹槽，其端部向背面伸展成弱骨化小突。横带片、阳端基

环不特化。囊形突小，凸出，中部浅凹陷。阳茎细长，端部骨化，具一钩状骨化带。

♀外生殖器：后表皮突约为前表皮突的2倍。囊导管极短，骨化，具骨环。囊体宽大，褶皱，中部骨化；内具1横带形囊片。

检视标本：IZCAS: 1♂，浙江庆元凤阳山大田坪，1290 m，2003. VIII. 6—10，韩红香采；1♂，福建武夷山三港，700 m，2007. VII. 25—26，谢娟采；2♂♂，福建武夷山黄溪洲，500 m，2006. VII. 29，薛大勇采；1♂，海南岛尖峰，900 m，1980. IV. 11，张宝林采；2♂♂，广东海南保亭，80 m，1973. V. 24，陈一心采；1♂，广西金秀罗香，200 m，1999. V. 15，韩红香采；1♂，广西防城扶隆，300 m，1999. V. 24，袁德成采；2♂♂，广西南宁，1980. IV. 13、21；1♂，广西龙胜，1980. VI. 13，宋士美采；1♂，广西桂林，150 m，1976. VII. 19，张宝林采；1♂，广西凭祥，230 m，1976. VI. 11，张宝林采；3♂♂，四川峨眉山清音阁，800—1000 m，1957. VII. 15、18，黄克仁采；5♂♂，同前，1957. VI. 30、VII. 16—17，朱复兴采；1♂，同前，1957. VI. 29，卢佑才采；1♂，云南保山坝湾，1100 m，1992. V. 19—23，薛大勇采。

BMNH: 1♂，holotype, Higashi suma, prov. Settsu, Honshu, 1901. VIII. 21, A. E. Wileman, Wileman Coll. B. M. 1929-261; 1♂，paratype, Higashi suma, prov. Settsu, Honshu, 1901. VIII. 20, A. E. Wileman, Wileman Coll. B. M. 1929-261; 2♂♂，paratypes, Yoshino, prov. Yamato, Honshu, 1900. VIII. A. E. Wileman, Wileman Coll. B. M. 1929-261; 1♂，Rothschild Bequest, B. M. 1939-1; 1♂，Junsai Numma, prov. Oshima, Hokkaido. Plains, 1903. VII. 6, A. E. Wileman, Wileman Coll. B. M. 1929-261.

ZFMK: 1♂，paratype, Higashi suma, prov. Settsu, Honshu, 20. VIII. 1901, A. e. Wileman, Wileman Coll. B. M. 1929-261.

AG Collection: 1♂ 2♀♀，Hongkong: Sheko, 8/93; 1♀，Hongkong: Tai Lung Farm at light, 17 June 1992; 1♂，Hongkong: Beaufort Island, 1. 5. 96; 2♂♂，Hongkong: TLCP [Tailam Country Park], 9. 6. 96.

分布：浙江、福建、海南、香港、广西、四川、云南；日本。

(335) 珊彩青尺蛾 *Eucyclodes lalashana* (Inoue, 1986) (图 367, 图 686, 图 881, 图版 XIX: 16)

Lophomachia lalashana Inoue, 1986b, *Bull. Fac. domest. Sci., Otsuma Wom. Univ.*, **22**: 216, figs 7—9, Holotype♂, Taiwan: Nantou Hsien, 'Wushe'. (BMNH)

Eucyclodes lalashana: Holloway, 1996, *Malay. Nat. J.*, **49** (3—4): 235.

♂触角短纤毛状；♀线形。额大部分绿色，下1/3褐色。♂后足胫节膨大，有毛束，2对距；有端突，长于第1跗节的1/2。♂第3腹节腹板有1对稀疏刚毛斑。♂第8节腹