

BMNH: 1♂1♀, Bir-Basch. south shore of Issykkul, 18 July 1902, (Kutsenko), Rothschild Bequest, B. M. 1939-1 (BMNH slide NO. 21701); 1♂, North-eastern shore of Issykkul, summer-house of Mr. Lomsshakoff, 25—26, June, 1905, (Kutsenko), Rothschild Bequest, B. M. 1939-1; 2♂♂, The defile of Turgan Ak-su, Tian shan, 16 Aug. 1905, (Kutsenko), Rothschild Bequest, B. M. 1939-1.

ZFMK: 1♀, (labeled: yellow label: *lissas* Wehrli, f. *zimmermanni* Hed, abgebildet Seitz IV. Suppl. fig.)

分布: 内蒙古、新疆、宁夏; 俄罗斯, 天山地区, 小亚细亚; 欧洲。

(226) 带无缰青尺蛾 *Hemistola cinctigutta* Prout, 1935 (图 274, 图 595, 图版 XVI: 23)

Hemistola cinctigutta Prout, 1935, in Seitz, *Macrolepid. World*, 4 (Suppl.): 20, pl. 3e.

Holotype♂, [China]: Tachien-lu [Kangding]. (ZFMK)

♂触角双栉形; 额暗红褐色, 略凸出; 下唇须细弱。后足胫节 2 对距。♂第 8 腹节腹板宽“V”字形凹陷, 两侧为丘状突。

前翅长: ♂12 mm。前翅顶角尖, 外缘浅弧形; 后翅顶角圆, 外缘有尾突。翅面暗蓝绿色; 前翅前缘为黄褐色, 散布极少深褐色点; 中点褐色, 外围有浅色圈(在模式标本中不明显), 未见内线; 两翅外线白色, 略曲折, 均很模糊; 两翅缘线褐色, 在脉端为白点; 缘毛白色, 脉端褐色。翅反面较正面色淡, 无斑纹。

♂外生殖器: 钩形突骨化, 尖端窄“V”字形分裂。背兜侧突和钩形突长度相当。颚形突中突细长且尖。抱器瓣简单, 短宽, 端部渐尖; 抱器背隆起; 腹缘中部凹陷。横带片为 1 对细长而尖的骨片。阳端基环横带状。囊形突半圆形凸出。有弱味刷。阳茎短粗, 端部骨化, 尖, 中间具 1 钝形骨化突, 上具密刺; 阳茎盲囊细小。

♀外生殖器: 未知。

检视标本: ZFMK: 1♂, holotype, Chasseurs indigènes de Tà-tsien-lou, Récolte de 1910 (with other labels, photographed.) . (已无触角、头部破损、仅存后足, 特征不易观察)

分布: 四川。

(227) 引无缰青尺蛾 *Hemistola detracta* (Walker, 1861) (图 275, 图 596, 图版 XVI: 24)

Geometra detracta Walker, 1861, *List Specimens lepid. Insects Colln Br. Mus.*, 22:

521. Holotype♂, North Hindostan [India]. (BMNH)

Thalassodes unduligera Butler, 1889, *Illust. typical Specimens Lepid. Heterocera Colln*

Br. Mus., 7: 21, 105, pl. 136, fig. 6. Syntypes, [India]: Kúlú. (BMNH)

Microloxia vestigiata Swinhoe, 1905, *Ann. Mag. nat. Hist.*, (7) 16: 629. Syntypes 3♂♂,