

检视标本：IZCAS: 1♀, 陕西留坝庙台子, 1350 m, 1998. VII. 21, 姚建采; 3♂♂ 5♀♀, 甘肃永登吐鲁沟, 2280 m, 1991. VII. 25—29, 薛大勇采; 5♀♀, 甘肃永登连城, 2000—2100 m, 1987. VII—VIII, 孟锋采; 11♂♂ 6♀♀, 青海同仁麦秀, 2950 m, 1992. VII. 30—VII. 1, 薛大勇采; 1♂, 青海西宁, 1989. VII. 2。

BMNH: 1♂, syntype, Ta-Chien-Lu, 8300 ft, Pratt coll. May & June, 1890, Leech Coll. 1900-64 (*Thalassodes inconcinnaria* sp. n. Type ♀ [♂]; red type label); 1♂, syntype, Pu-tsu-Fang, 9820 ft, Native coll. June & July, Leech Coll. 1900-64 (BMNH slide NO. 21708) .

分布：陕西、甘肃、青海、四川。

(233) 空无缰青尺蛾 *Hemistola isommata* Prout, 1935 (图版 XVI : 30)

Hemistola isommata Prout, 1935, in Seitz, *Macrolepid. World*, 4 (Suppl.): 20, pl. 3 f. Holotype ♀, [China]: Tachien-lu [Kangding] . (ZFMK)

♀触角短双栉形, 栉齿长度短于触角干直径。额下缘污白色, 其余大部分深红褐色, 不凸出。下唇须短小, 不伸出额外。头顶绿白色。胸部背面同翅色。后足胫节 2 对距。

前翅长: ♀ 17—18 mm。翅面蓝灰色。前翅顶角较钝, 外缘浅弧形; 后翅外缘在 M_3 脉端呈折角状凸出。前后翅中点为白色圆圈状, 圈内同翅面颜色。前翅前缘黄绿色; 内线波状, 不清晰; 外线白色锯齿形, 在翅脉上为尖齿, 走向几乎和外缘平行。后翅外线白色锯齿形, 在 M_3 — CuA_1 间外凸。前后翅缘线暗绿色; 缘毛同翅色。翅反面绿白色, 无斑纹。

♂♀外生殖器: 未知。

检视标本：BMNH: 1♀, paratype, Siao-Loû, Chasseurs, Indigènes du P. Déjean, 1903, Ex. Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3.

ZFMK: 1♀, holotype, Ta-tsien-Lou, Chasseurs, Indigènes du P. Déjean, 1904 (other labels: red label: *Hemistola isommata* Prt. ♀ Holotype; *Hemistola detracta* Walker, Seitz. pl. 2h; Seitz. Suppl. Vol. 4, p. 20, t. 3f. (1935)).

分布：四川。

(234) 凯无缰青尺蛾 *Hemistola kezukai* Inoue, 1978 (图 281, 图 602, 图版 XVI : 31)

Hemistola kezukai Inoue, 1978, *Bull. Fac. domest. Sci., Otsuma Wom. Univ.*, 14: 214, figs 20, 24. Holotype♂, Taiwan: Nantou. (BMNH)

♂触角双栉形, 最长栉齿约为触角干直径的 1.5 倍, 端部栉齿渐短; ♀未知。额及下唇须背面深红褐色, 下唇须腹面白色, 短小, 不伸出额外。头顶前半部白色, 后半部