

圆；抱器背中部凸出；抱器腹端部略隆起，具微刺。阳茎细长，端部骨化，中部具几个骨化齿。

♀外生殖器：未知。

检视标本：BMNH: 1♂, holotype, Formosa Hualien: Tayuling, 1—3. VII. 1973, M. Owada, Inoue Coll. B. M. 1992-71, Type status verified K. Buckmaster 1993, Type photographed in colour; 1♂, paratype, Nan Tow Hsien, Formosa, 1969, ex. H. Kezuca, No. 1300, Birt. Mus. 1978-260 (BMNH slide NO. 10132) .

分布：中国台湾。

(236) 四圈无缰青尺蛾 *Hemistola orbiculosa* Inoue, 1978 (图 283, 图 603, 图版XVI: 33)

Hemistola orbiculosa Inoue, 1978, Bull. Fac. domest. Sci., Otsuma Wom. Univ., 14: 213, figs 19, 22, 23. Holotype♂, Taiwan: Nantou. (BMNH)

♂触角双栉形，最长栉齿约为触角干直径的 2 倍，尖端纤毛状；♀短双栉形。下唇须背面和额均黄褐色杂少量红褐色，♂下唇须尖端不伸出额外。头顶前半部白色，后半部同翅色。♂后足胫节膨大，有 2 对距。♂第 3 腹节腹板具 1 对刚毛斑。♂第 8 腹节腹板强骨化，中间为“U”形凹陷，两侧为粗壮骨化突，上下较均匀，端部向内倾斜。

前翅长：♂♀ 17—18 mm。翅面蓝灰色，略带蓝绿色调。前翅外缘略呈浅弧形凸出；前缘黄褐色；内线和外线白色锯齿形；中点白色圈状。后翅外缘在 M_3 脉端凸出 1 尖齿；中点同前翅；外线白色锯齿形。前后翅缘线深褐色；缘毛白色，在脉端为褐色。

♂外生殖器：钩形突强骨化，上下粗细均匀，端部浅二分叉。背兜侧突细长，长度超出钩形突。颚形突中突钝，腹面具密刺。抱器瓣宽阔，抱器背中部凸出；抱器腹发达，边缘骨化，抱器腹端突钝圆，粗糙；在抱器腹中部内侧亦有 1 大骨化齿状突；抱器瓣腹缘端部具 1 小凸起。囊形突宽大。阳茎短粗，骨化。

♀外生殖器（据 Inoue, 1978）：交配孔周围骨化；后阴片为 1 对三角形骨片，其后缘呈微弱锯齿形。囊导管很短，骨化。囊体袋状，囊颈附近弱骨化且褶皱；无囊片。

检视标本：BMNH: 1♂, holotype, Nan Tow Hsien, Formosa, 1969, ex. H. Kezuca, Inoue Coll., B. M. 1992-71 (BMNH slide NO. 16340; type status verified K. Buckmaster 1992); 1♂, Kanschirei, Formosa, April 17 1908, (A. E. Wileman), Rothschild Bequest, B. M. 1939-1 (BMNH slide NO. 9927) .

分布：中国台湾。

(237) 饰无缰青尺蛾 *Hemistola ornata* Yazaki, 1994 (图版XVI : 34)

Hemistola ornata Yazaki, 1994, in Haruta, Tinea, 14 (Suppl. 1): 9, pl. 67, fig. 8; text-fig. 335. Holotype♂, [Nepal]: Janakpur, Jiri. (NSMT)