

Indigènes du P. Déjean, 1903; 1 ♂, Li-kiang (China), Provinz Nord-Yuennan, 25. 6. 1935, H. Höne (Besides the list above, there are also a lot of specimens from Likiang, in March, May, June, July, September).

**分布:** 陕西、甘肃、湖北、四川、云南、西藏。

(239) 源无疆青尺蛾 *Hemistola periphanes* Prout, 1935 (图 285, 图 605, 图版 XVI: 36)

*Hemistola periphanes* Prout, 1935, in Seitz, *Macrolepid. World*, 4 (Suppl.): 20, pl. 3e.

Holotype ♂, [China]: Tse-kou. (BMNH)

♂触角双栉形, 栉齿长度略超过触角干直径, 尖端纤毛状; ♀线形。额凸出、红褐色。下唇须弱小, 背面红褐色, 不伸出额外。头顶前半部白色, 后半部绿色。胸部背面同翅色。♂后足胫节膨大、有毛束、2对距。♂第3腹节腹板有1对刚毛斑。♂第8腹节腹板深凹陷。

前翅长: ♂16--17 mm。翅面绿色, 带蓝绿色调。前翅顶角尖; 外缘直; 前缘黄褐色; 内线白色锯齿形; 外缘白色, 在 CuA<sub>1</sub> 下方锯齿形, 在 CuA<sub>1</sub> 上方为脉上白点; 中点在翅脉端颜色略加深; 无缘线; 缘毛白色, 翅脉端黄褐色。后翅顶角圆, 外缘在 M<sub>3</sub> 脉端具1小突; 外缘白色锯齿形, 几乎和外缘平行, 在臀褶处内凹; 缘毛同前翅。翅反面绿白色, 无斑纹。

♂外生殖器: 钩形突端部浅二分叉。背兜侧突膜质, 短粗, 略短于钩形突。颚形突中突骨化, 杆状。抱器瓣基部宽阔, 端半部骤窄, 抱器背中部凸出, 基部具1骨化刺突; 抱器腹短, 端部圆弧状凸起, 其外侧抱器瓣腹缘深凹陷, 抱器腹基部内侧具1小三角形弱骨化突。囊形突中度凸出。有味刷。阳茎骨化, 中部具1骨化突。

♀外生殖器: 未知。

**检视标本:** BMNH: 1♂, holotype, Tsekou, P. Dubernard, 1898, Ex. Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3; 1♂, Tse Kou, R. P. Dubernard, 1895, Ex. Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3; 1♀, Siao-Lou, Chasseurs Indigènes, du P. Déjean, 1903, Ex. Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3.

**分布:** 四川、云南。

(240) 赭无疆青尺蛾 *Hemistola rubricosta* Prout, 1916 (图 286, 图 606, 图 846, 图版 XVI: 37)

*Hemistola rubricosta* Prout, 1916a, *Novit. zool.*, 23: 15. Holotype ♂, [India]: Sikkim, Tonglo, 10 000 ft. (BMNH)

♂触角双栉形, 最长栉齿约为触角干直径的2.5倍, 尖端纤毛状。额及下唇须背面红褐色; 下唇须腹面白色, 短小, 尖端不伸出额外。♂后足胫节膨大、有毛束、2对距。