

前足及中足红褐色带桃红色。头顶前缘白色，后部大部分绿色。胸部背面同翅色。腹部背面第2、第3节中部有小红褐色斑，末端几节粉红色。 σ 第3腹节腹板具1对刚毛斑，中间有稀疏刚毛相连。 σ 第8腹节腹板弱骨化，中间宽阔凹陷。

前翅长： σ 15—17 mm。翅面蓝绿色。前翅顶角略尖；前缘粉红色；内线白色，波状，在中室下缘至2A脉间显著凸出；中点为中室端脉上的暗绿色小点；外线白色，浅锯齿形；在CuA₁—2A脉间向内弯曲明显；缘毛基半部白色，端半部粉色。后翅顶角圆；外缘在M₃脉端有微弱凸出；外线白色锯齿形；中点同前翅；缘毛同前翅。翅反面淡绿白色，无斑纹；前翅前缘粉红色，基部下方有暗褐色。

σ 外生殖器：钩形突细长刺状，向尖端渐细，不分叉。背兜侧突膜质、宽阔、短。颚形突中突舌状，有皱纹形小褶。抱器瓣膜质狭长，端部钝圆；抱器背中部具1小膜质突，膜质突至端部前缘较直；腹缘中部凹陷。横带片弱骨化，接近片状。囊形突较小，半圆形。味刷微弱。阳茎端部骨化，角状器为阳茎端膜上密集骨化小刺。

φ 外生殖器：后表皮突长度为前表皮突的3倍。前后阴片漏斗状。囊导管极短。囊体部分骨化、褶皱；无囊片。

检视标本：BMNH：1 σ ，holotype，tonglo，Sikkim，10 000 ft，July 1886，H. J. Elwes，Seitz，XII.14，Rothschild Bequest，B. M. 1939-1；2 $\sigma\sigma$ ，Tonglo，Sikkim，10 000 ft，July 1886，H. J. Elwes，Seitz，XII .14，Rothschild Bequest，B. M. 1939-1；1 σ ，*ibidem*，Ex. Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3；1 σ ，Darjeeling，Mowis，1891，Ex. Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3；2 $\sigma\sigma$ ，Yatung，Tibet，A. E. Hobson，98-201 (one of these two length of forewing only 12 mm)；1 σ ，Bhutan，Rothschild Bequest，B. M. 1939-1.

分布：西藏；印度，不丹。

(241) 红缘无缰青尺蛾 *Hemistola rubrimargo* Warren, 1893 (图287, 图607, 图版XVI : 38)

Hemistola rubrimargo Warren, 1893, Proc. zool. Soc. Lond., 1893: 354, pl. 31, fig. 3. Holotype σ , India: Sikkim. (BMNH)

σ 触角双栉形，最长栉齿约为触角干直径的2倍，末端无栉齿； φ 线形。额黄褐色。下唇须短小，仅尖端伸达额外，腹面污白色，背面黄褐色， φ 下唇须第3节延长，略短于1/2伸出额外。头顶前缘白色，中部以后和胸腹部背面蓝绿色。后足胫节略膨大， σ 具毛束，2对距，具短端突。腹部背中线上有小白点，周围有红色和褐色鳞片。 σ 第3腹节腹板中部具1对刚毛斑，中间有刚毛相连。 σ 第8腹节腹板中部凹陷，两侧凸出。

前翅长： σ 13—15 mm； φ 16 mm。翅淡蓝绿色；前翅前缘浅黄褐色，散布红褐色

碎纹；内外线白色，内线细弱波状，外线锯齿形，均在后缘形成小红点；中点暗绿色细条状；缘线紫红色，在翅脉端有小白点；缘毛基半部白色，在脉端紫褐色，端半部灰黄色。后翅外缘中部凸出1尖角；顶角圆；外线白色锯齿形；中点暗绿色细条状；缘线、缘毛同前翅。翅反面淡蓝绿色，前翅前缘同正面，几乎无其他斑纹。

♂外生殖器：钩形突粗细均匀，端部不分叉。背兜侧突粗壮，膜质，端部略细。颚形突中突细长，端部钝，腹面具小齿。抱器瓣狭长，宽窄均匀，端部钝圆；抱器背中部略凸出，其下方有1三角形骨化突，折向抱器腹方向；抱器瓣中部具刚毛和1小骨化突；抱器瓣腹缘中部凹陷。横带片中部凸出。囊形突半圆形。味刷弱。阳茎骨化，端部膨大；阳茎盲囊特别细长。

♀外生殖器：后表皮突细长，长度约为前表皮突的3倍。后阴片骨化，近圆形。囊导管几乎不可见；囊体上1/3褶皱，下2/3近球形，囊体内密布向内着生的花齿。

检视标本：IZCAS：1♀，湖北神农架大酒壶，1800 m, 1981. VIII. 5, 韩寅恒采；1♂，湖南衡山，1979. VIII. 22, 张宝林采；3♂♂，云南腾冲大蒿坪，2020 m, 1992. V. 24—26, 薛大勇采；1♂1♀，（云南？）封子坪，1989. IX. 12；1♂，云南景东，1981. V. 9；1♂，西藏波密通麦，2100 m, 2005. VIII. 29, 汪学俭采；1♂，西藏林芝排龙，2115 m, 2005. IX. 1, 汪学俭采；1♂，西藏墨脱波墨公路80km, 2118 m, 2006. VIII. 25, 郎嵩云采。

BMNH：1♂，holotype, Sikkim, O. Möller, Collectio H. J. Elwes, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1 (BMNH slide NO. 6043)；1♂，Khasis, April 1896, Nat. Coll., Rothschild Bequest, B. M. 1939-1；1♂，Khasis, Nat. Coll., Collectio H. J. Elwes, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1；1♂，Darjiling, (F. Moller), Rothschild Bequest, B. M. 1939-1；1♂，Darjeeling, 7500 ft, May-June 1839, A. V. Knyvett, Collectio H. J. Elwes, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1 (BMNH slide NO. 11102)；1♀，Assam, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1 (BMNH slide NO. 6951)。

分布：湖北、湖南、云南、西藏；印度，尼泊尔。

(242) 金边无缰青尺蛾 *Hemistola simplex* Warren, 1899 (图288, 图608, 图848, 图版XVI : 39)

Hemistola simplex Warren, 1899, *Novit. zool.*, 6: 24. Holotype ♀, Formosa [Taiwan]: North Mountains. (BMNH)

Hemistola fulvimargo Inoue, 1978, *Bull. Fac. domest. Sci.*, *Otsuma Wom. Univ.*, 14: 216, fig. 21. Holotype ♂, Taiwan: Nantou, Nanshangchi. (BMNH)

♂触角双栉形，尖端纤毛状，最长栉齿约为触角干直径的3倍；♀双栉形。额及下