

分布：北京、河南、甘肃、浙江、湖南、福建、台湾、四川。

(243) 平无疆青尺蛾 *Hemistola stathima* Prout, 1938 (图版 XVI : 40)

Hemistola stathima Prout, 1938, in Seitz, *Macrolepid. World*, 4 (Suppl.): 219, pl. 17b. Holotype ♀, [China]: Szechuan (Sichuan), Tu-pa-kö. (BMNH)

♀：触角纤毛状。额下半部污白色，上半部褐色。下唇须纤细，第3节延长，约1/3伸出额外。头顶白色。胸部背面同翅色。

前翅长：♀12 mm。翅面浅蓝绿色。内线粗壮、白色，弧形弯曲；外线粗壮、白色，较直，在近前缘处向内弯曲。后翅顶角圆；外缘在 M_3 脉端略凸出；外线粗壮、白色，浅弧形。前后翅缘线黄褐色；缘毛绿白色。翅反面无斑纹。

♂♀外生殖器：未知。

检视标本：BMNH: 1 ♀, holotype, Tu-pa-kö, 7400 ft, 8 September, Szechwan, Keldy-Roosevelt, expedition, 1929, Rothschild Bequest B. M. 1939-1.

分布：四川。

(244) 细线无疆青尺蛾 *Hemistola tenuilinea* (Alphéraky, 1897) (图 289, 图 609, 图 849, 图版 XVI : 41)

Thalera tenuilinea Alphéraky, 1897, in Romanoff, *Mém. Lépid.*, 9: 182, pl. 10, fig. 7. Holotype ♂, Korea.

Hemistola tenuilinea: Prout, 1935, in Seitz, *Macrolepid. World*, 4 (Suppl.): 20, pl. 3e.

♂触角双栉形，最长栉齿约为触角干直径的2倍，端部栉齿渐短；♀双栉形。额及下唇须均暗红褐色，额中度凸出，鳞片正常；♂下唇须尖端不伸出额外。头顶前半部黄白色，后半部绿色。胸腹部背面绿色，腹部第2—5节有纵向小立毛簇。♂后足胫节膨大、有毛束，2对距。♂第3腹节腹板具1对刚毛斑。♂第8腹节边缘骨化、浅凹陷。

前翅长：15—16 mm。翅面绿色。前翅外缘凸出；前缘黄褐色；内线白色，波状；中点较翅色略深，周围有白圈；外线白色，锯齿形，锯齿均较大，在 M_1 上方不清晰或消失；缘线淡褐色；缘毛白色，在翅脉端褐色。后翅顶角圆，前缘和后缘几乎等长，外缘凸出，在 M_3 脉端具1尖齿；中点同前翅；外线白色，浅锯齿形，在 M_3 至 CuA_1 间外凸；缘线、缘毛同前翅。

♂外生殖器：钩形突弱骨化，上下粗细均匀，端部极浅二分叉。背兜侧突宽阔、膜质，长度和钩形突相当。颞形突中突细长且尖。抱器瓣宽阔，抱器背中部有小膜质突；抱器腹发达，内缘具1列小齿，具骨化端突；端突上方抱器瓣腹缘凹陷，凹陷上方具小钝膜质突。横带片膜质。囊形突凸出。有发达味刷。阳茎短粗，端部细、骨化。

♀外生殖器：后表皮突长约为前表皮突的2.5倍。后阴片弧形，中部浅凹。囊导管