极短，窄。囊体大，囊颈处骨化、褶皱。

寄主：壳斗科 Fagaceae：日本常绿橡树 *Quercus acuta*、麻栎 *Quercus acutissima*、枹栎 *Quercus serrata*、栓皮栎 *Quercus variabili*。

检视标本：IZCAS：广西苗儿山九牛场，1100 m，1985. Ⅶ. 5，方承莱采；1♀，湖南天平山，1981. Ⅶ. 5，李柏谦采；1♂，Maoershan，Mandshuria or.（ex. ZFMK）；1♂，湖北神农架松柏镇，950 m，1980. Ⅶ. 4，虞佩玉采。

BMNH：1♂，Takao san，16 July 1949，H. Inoue，Brit. Mus. 1955-373（BMNH slide NO. 21784）.

ZFMK：1♂，Seisbin-Olto，Nord-Korea，A. Kricheldorff（other label：*H. tenuilinea* Alph.；yellow label：abgebildet Seitz IV. Suppl. fig.；coll. Wehrli，via L. B. Prout）；1♂，Seisbin-Olto，Nord-Korea，A. Kricheldorff.

分布：湖北、湖南、广西、台湾；日本，朝鲜半岛。

(245) 简无缰青尺蛾 *Hemistola unicolor*（Thierry-Mieg，1915）（图 290，图 610，图版 XVI：42）

Hemithea unicolor Thierry-Mieg，1915，*Miscnea. ent.*，**22**（10）：39. Syntypes 2♀♀，[China]：Yunnan，Tali.（MNHN）

Hemithea unicolor：Prout，1933，*in* Seitz，*Macrolepid. World*，**12**：115.

Hemistola unicolor：Scoble，1999，*Geometrid Moths of the World*，*a Catalogue*，**1**：426.

♂触角双栉形，最长栉齿约为触角干直径的 3 倍，端部栉齿渐短；♀未知。额不凸出，额及下唇须背面褐色，腹面白色，下唇须短小，细弱，尖端伸出额外。头顶及胸部背面同翅色。♂后足胫节不膨大，2 对距。♂第 3 腹节无刚毛斑。♂第 8 腹节不特化。

前翅长：♂13 mm。翅面淡绿色，略带蓝绿色调；前后翅外缘光滑，前翅外缘倾斜，后翅外缘在 M_3 脉端有钝凸出；翅正面和反面无任何斑纹；缘毛同翅色。

♂外生殖器：钩形突骨化、指状，端部不分叉。背兜侧突短粗、膜质。颚形突中突指状、具刺。抱器瓣简单，大部分膜质，端部圆钝；抱器腹具 1 钝三角形骨化片；囊形突凸出。阳茎大部分骨化，中部具数枚骨化齿。

♀外生殖器：未知。

检视标本：IZCAS：5♂♂，云南丽江山玉龙山，23 Ⅶ—21 Ⅷ 1962，宋士美采。BMNH：1♀，syntype，Tali，Haut Yunnan，1917，Coll. P. Thlerry-Mieg，Museum Paris（照片）；1♂，Moupin，Krichellorff coll.，June 1890，Leech Coll，1900-64.

分布：四川、云南。